معجم الرياضيات Mathematics Dictionary

الجزء الثانى

وضع : لجنة الرياضيات بالمجمع

إشواك : الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور

عضو المجمع ومقرر اللجنة

إعداد وتنفيذ: أوديت إلياس

وكيل الوزارة لشئون مكتب المجمع السيد:هشام عبد الرازق المحرر العلمي

۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰م

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية



لجنهة مصطلحات الرياضيات

(مقـررأ)	عطية عبد السلام عاشور	الأستاذ الدكتور
(عضواً)	محمود مختار	الأستاذ الدكتور
(عضوأ)	سيد رمضان هدارة (رحمة الله)	الأستاذ الدكتور
(عضوأ)	بدوي طبانة (رحمه الله)	الأستاذة الدكتور
(خبیراً)	أحمد فؤاد غالب	الأستاذ الدكتور
(خ بير أ)	عبد الشافي عبادة	الأستاذ الدكتور
(خبيراً)	على حسين عزام	الأستاذ الدكتور
(محرراً)	هشام سید عبد الرازق	السيــــد

بسم الله الرحمن الرحيم تصدير

للدكتور شوقى ضيف

امتن الله عز سلطانه - في القرآن الكريم على النساس مرارا بمعرفتهم مواقيت العبادات في الدين ومختلف شئونهم في الحياة بحساب مواقع الشمس والقمر وسيرهما ، يقول -جل شأنه - (الشمس والقمربحسبان) أي أنهما يسيران سيران منتظما غاية الانتظام ، أما حسبان الشمس فباختلاف أوقاتها نهارا واختلاف فصولها حرارة وبرودة ، وأما حسبان القمر فبطلوعه في أول الشهر هلالا ضئيلا ، ويظلل يزداد نورا في كل ليلة تالية إلى أن يصير بدرا في الليلة الرابعة عشسرة ، وياخذ بعدها في التناقص حتى الليلة الثامنة والعشرين ، ويقول الله في سورة يونس :

(هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) • ومنازل القمر منذ طلوعه فى أول ليلة بالشهر إلى آخر ليلة قمرية ثمان وعشرون منزلا ، لكل ليلة منزل • وحساب السنة - كما فى القرآن الكريم اثنا عشر شهرا قمريا بفصولها الأربعة وبالأيام والليالي والأسابيع فى كل شهر ، ويقول الله : ويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج •

وامتنان الله على المسلمين بمعرفة مواقيت العبادات وحسابها المنتظم عن طريق الشمس والقمر جعل المسلمين يعنون بعلمي الغلك والحساب ، ويسبقون فيها الأمم القديمة ، وقد طوروا علم الحساب وأعداده ، ومعروف أن الأمم القديمة ـ قبل العرب – اختلفت في الرمز لأعداد الحساب وأرقامه، فكان الفراعنة يرمزون لها بنفس الرموز بخطوط قائمة وأفقية ، ومثلهم الصينيون وكان الرومان يرمزون لها بنفس الرموز التي لا يزال الغربيون يرمزون بها في كتبهم إلى أرقام الفصول والأبواب ، وكان الهنود يرمزون لها بالأعداد من 1-9 ، ونقل العرب عنهم هذا النظام وأعطوا الصفر فيه اسمه ، وأعدوا به النظام العشرى (العشرات والمئات والآلاف) وبذلك أصبح علم الحساب أو الرياضيات علما عالميا ،

وأهم عالم رياضى - عند العرب - الخوارزمى ، وكان مشرفا على المرصد الفلكى لعهد الخليفة المأمون ، وهو الذى وضع علم الجبر باسمه ومعادلاته بكتابه : " الجبر والمقابلة "، وبه يفتتح عصرا جديدا بأكمله فى التاريخ العالمى للرياضيات ، وعرف الهنود الصفر ولكنهم لم يستغلوه ، واستغله الخوارزمى فى وضعه للنظام العشرى الذى أحدث انقلابا فى علم الحساب والرياضيات ، ووضع الخوارزمى فلى الحساب للجذر علامة الجيم مقلوبة هكذا : \ وأصبحت رمزا عالميا له ، واشتغل الخوارزمى بحساب المثلثات وعلم الفلك ، ورسم خريطة للعالم فى عصره ،

وخَلُّف الخوارزمي رياضيون عظام ، منهم قسطا بن لوقا في الربع الأول من القرن العاشر الميلادي ، وأبو الوفا البوزجاني في أواخر القرن العاشـــر الميـــلادي الذي حلُّ معادلة الدرجة الرابعة ، وعمر الخيام في الثلث الأول من القررن الثاني عشر الميلادي الذي حلّ معادلة الدرجة الثالثة = بطريقة خطوط التقاطع للأسكال المخروطية • ولا ننسى الرياضيين الأندلسيين العظام من أمثال البطروجي الذي يعد في طليعة الرياضيين العالميين ، وكان يعيش في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادى • وجاء بعده الكاشاني في منتصف القرن الخامس عشر صاحب نظرية الكسور مع الأعداد التي أودعها كتابه " مفتاح الحساب " وكان خاتمة النهضة الرياضية العربية ، بل لقد كان فيها شمعة أخيرة شاذة ، فإن النهضة العلمية عند العرب كانت قد أخذت في الانتكاس منذ القرن الثاني عشر الميلادي ، بينما أخذ نجم الحضارة الأوربية في البزوغ مع تعطش شديد لمعرفة العلوم العربية وترجمتها إلى اللاتينية ، وتعلم العربية منهم كثيرون وأتقنوها ، ولم يتركوا للعرب كتابا علميا أو فلسفيا إلا نقلوه وترجموه •ونقلوا عن المغرب صورة أرقامه الحسابية وأشاعوها بينهم ، وأشاعوا معها الصفر ونظامه العشرى وسموه zero كما أشاعوا بينهم عليم ينهضون بها نهضة كبرى • وانقلب الوضع ، فأصبحنا الآن نـــدرس ما للأوربيين فيها من نظريات ومصطلحات علمية لا حصر لها وها هو العالم الرياضى الكبير الدكتور عطية عبد السلام عاشور يبذل مع من اصطفاهم من تلاميذه جهدا شاقا في تعريب الرياضيات ووضع معجم عربى لها ، أخرج منه جزءه الأول ، ويخرج الآن جزءه الثانى ، وأثنى ثناء جما على صنيعه وصنيع مساعديه في إخراج أجزاء هذا المعجم النفيس ، والله – وحده – هو الذي يجزيهم عما يبذلون فيه مسن جهود مضنية ،

رئيس المجمع اللغوى مشوقي مربيعت الأستاذ الدكتور شوقى ضيف

50% y

• . :

بسم الله الرحمن الرحيم تقـــديم

يسر لجنة مصطلحات الرياضيات بمجمع اللغة العربية أن تقدم إلى المكتبة العربية الجزء الثانى من معجم الرياضيات ويضم بين دفتيه المصطلحات العربية المقابلة لتلك التى تبدأ فى اللغة الإنجليزية بالحروف D.E.F.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الرموز الرياضية التي أخذت صفة العالمية ، وكما وعدنا في الجزء الأول من المعجم ، تمت كتابة المعادلات والجمل الرياضية من اليسار إلى اليمين كما هو متبع في كتابة الرياضيات في جميع اللغات سواء ذات الأصل اللاتيني أو غيره كالصينية واليابانية وغيرها . وقد أدى ذلك إلى إزالة صعوبات عديدة سبق ذكرها في مقدمة الجزء الأول من المعجم .

وقد أشرَفَت على إخراج هذا المعجم لجنة الرياضيات التي تشرف بعضوية السادة الأساتذة أعضاء المجمع :

الدكتور محمود مختار والمرحوم الدكتور سيد رمضان هدارة والمرحوم الدكتور بدوي طبانة ، والخبراء الأساتذة الدكتور عبد الشافى عبادة والدكتور أحمد فؤاد غالب والدكتور على عـزام والمرحوم الدكتور نصر على حسن . واللجنة تدين بالشكر للأستاذ الدكتور شوقى ضيف رئيس المجمع ولأعضاء مجلس المجمع الموقر على ما قدموه من مسانده في عملها. ولا يفوتني أن أنوّه بالجهد الكبير الذي قدمته السيدة أوديت إلياس وكيل الوزارة لشؤون مكتب المجمع والسيد هشام عبد الرازق محرر اللجنة .

والأمل كبير في أن يكون الجزء الثاني من معجم الرياضيات إضافة مفيدة للمشتغلين بتعليم وتعريب العلوم الرياضية في مصر والعالم العربي . والله الموفق .

عطية عبد السلام عاشور عضو المجمع ومقرر لجنة مصطلحات الرياضيات



اختبار "دالمبير" للتقارب (أو للتباعد) = اختبار النسبة المعمَّم D'Alembert's test for convergence (or divergence) = generalized ratio test

(ratio test اختبار النسبة)

حركة توافقية مخمَّدة

damped harmonic motion

حركة توافقية تتناقص سعتها باستمرار.

ذبذبات مخمدة

damped oscillations

ذبذبات تتناقص سعتها باستمر ار .

كرات "داندلين"

Dandelin spheres

إذا عرِّف قِطع مخروطي على أنه تقاطع مستوى مع مخروط دائري، فإن كرات "داندلين" هي الكرات التي تمس المستوى وتمس أيضاً المخروط في نقط دائرة واقعة عليه. وتوجد كرة واحدة من هذا النوع إذا كان المقطعُ قُطِعاً ﴿ مكافئًا. أما إذا كان المقطع قطعا ناقصا أو زائدا فتوجد كرتان من كرات "داندلين" وتكون نقطة تماس كرة "داندلين" مع المستوى بؤرة للقِطع المخروطي.

نظرية الوحدوية لـ "داريو"

Darboux's monodromy theorem

نظرية تنص على أنه إذا كانت الدالة f في المتغير المركب z تحليلية في المنطقة المحدودة D والمحددة بالمنحنى البسيط المغلق C ، وكانت الدَّالة نفسها متصلة في المنطقة المغلقة D+C ولا تتكرر قيمها لجميع

C فإن C فإن C النقط C على C فإن C فإن C فيمها لجميع النقط C

نظرية "داربو"

Darboux's theorem

إذا كانت الدالة f محدودة على الفترة المغلقة $[a\,,\,b]$ وكانت الأعداد M_1,M_2,\cdots,M_n و M_1,M_2,\cdots,M_n هي أقل الحدود العليا وأكبر الحدود الدنيا للدالة f(x) على الفترات δ طول أكبر هذه الفترات الجزئية، فإن النهايتين الآتيتين توجدان :

$$\lim_{x \to 0} \left[M_1(x_1 - a) + M_2(x_2 - x_1) + ... + M_n(b - x_{n-1}) \right]$$

$$\lim_{\delta \to 0} \left[m_1(x_1 - a) + m_2(x_2 - x_1) + \dots + m_n(b - x_{n-1}) \right]$$

والنهاية الأولى هي تكامل " داربو " العلوى للدالة f ويكتب على الصورة $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$

والنهاية الثانية هي تكامل " داربو " السفلي للدالة f ويكتب على الصورة $\int_{0}^{x} f(x) dx$

والشرط الضروري والكافي لكي تكون الدالة f قابلة للتكامل الريمانى هو f تساوى هذين التكاملين.

بيانات

data (datum)

١- القيم العددية أو النوعية التي يُحصل عليها من المشاهدات أو التجارب لعلمية.

٢- الأرقام والحروف والرموز التي يتغذى بها الحاسب.

بيانات التحكم

data, control

بيانات للتعريف أو للاختبار أو للتنفيذ أو لتعديل برنامج.

خطأ في البيانات

data error

خطأ في البيانات قبل معالجتها.

بيانات مجمعة

data, grouped

بيانات موزَّعة على فترات ويعالج كل منها كما لو كانت جميعاً وأَقْعة فيَّ مركز الفترة.

بيانات أمامية

data, master

بيانات لا تتغير كثيرا وتزوَّد بها عمليات المعالجة، ومنها الأسماء والرسَّب في حالة البيانات المخزنية. حالة البيانات المخزنية.

بيانات مرتبة

data, ordered

بيانات إحصائية مربّبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا.

بيانات دائمة

data, permanent

بيانات بوحدة التخزين لا يمكن تغييرها عن طريق نظام الحاسب نفسه.

١ - معالجة البيانات

data processing

معالجة العناصر الرئيسية للمعلومات طبقاً لقواعد مضبوطة للوصول إلى عمليات كالتصنيف والتلخيص والتسجيل.

٢ - تشغيل البيانات

استخدام البيانات لإعداد السجلات والتقارير ونحوها.

تنقية البيانات

data purification

تصحيح للأخطاء التي قد توجد في البيانات قبل إدخالها نظام معالجة آلي.

بیانات خام

data, raw

بيانات لم تعالج قبل التشغيل، وقد تكون على صورة مقبولة بالنسبة للآلة.

بيانات إحصائية

data, statistical

معلومات مجمَّعة في صورة عددية عن أشياء أو أشخاص ونحو ذلك.

بنية البيانات

data structure

الطريقة التي تمثّل بها البيانات وتخزّن في نظام للحاسب.

بيانات اختبار

data, test

بيانات تستخدَم لاختبار صلاحية دورات الحاسب أو دقتها.

نقل البيانات

data transfer

نقل البيانات داخل وحدة التخزين نفسها أو إلى وحدة تخزين أخرى.

المعالجة الآلية للبيانات

datamation

معالجة البيانات وتشغيلها بطريقة آلية.

والمصطلح الأجنبي مأخوذ عن العبارة (data automation).

زمن موقوف

dead time

فترة زمنية محددة تُترك عمدا بين حدثين مترابطين لتجنب تراكبهما الذي قد يسبب اضطرابا.

معدَّل الوفيات

death rate

احتمال وفاة شخص خلال عام بعد بلوغه سنا معينة، وهذا الاحتمال يساوى d_x عدد الأشخاص المتوفين خلال العام ، d_x عدد الأشخاص المتوفين خلال العام ، d_x عدد الأشخاص الذين يبلغون السن x في المجموعة التي وضع على أساسها جدول الوفيات.

معدَّل الوفيات المركزي خلال عام

death rate during one year, central

(central death rate

(انظر: معدَّل الوفيات المركزي

ديكا

deca

بادئه تدل عندما تضاف إلى وحدة ما على عشرة أضعافها.

عَقد

decade

١- مجموعة الأعداد من 1 إلى 10 أو من 11 إلى 20 وهكذا.

٢- عشر سنوات.

مضلع عشري

decagon

مضلّع عدد أضلاعه عشرة ويكون المضلّع العشري منتظما إذا تساوت أطوال أضلاعه وتساوت قياسات زواياه.

عشارى السطوح

decahedron

مجسّم عدد سطوحه عَشرة.

ديكامتر

decameter

وحدة للطول في النظام المتري للوحدات تساوى عشرة أمتار.

زمن الاضمحلال

decay time

الزمن الذي تستغرقه كمية ما لتهبط إلى نسبة معينة من قيمتها الابتدائية.

تباطؤ (عجلة تقصيرية)

deceleration

عجلة في عكس اتجاه السرعة.

(acceleration فظر: تسارُع)

عدد عشري

decimal = decimal number

عدد مكتوب بالنظام العَشري، وتقتصر هذه الصفة أحيانا على الكسور العَشرية (decimal fractions) وهي الأعداد المكتوبة بالنظام العَشري والتي لا تتضمن أرقاما على يسار العلامة العَشرية فيما عدا الأصفار.

العدد العشري المكافئ لكسر اعتيادي

decimal equivalent of a common fraction

العدد العَشري المساوي للكسر الاعتبادي، مثال ذلك $\frac{1}{8} = 0.125$.

مفكوك عشري

decimal expansion

كتابة العدد الحقيقي في نظام الأعداد العَشرية.

عدد عشري منته

decimal, finite = decimal, terminating عدد عَشري يتكون من عدد محدود من الأرقام.

عدد عشري لا منته

decimal, infinite = decimal, non terminating عدد عَشري يتكون من عدد لا نهائي من الأرقام على يمين العلامة العشرية.

القياس العشرى

decimal measure

نظام للقياس كل وحدة من وحداته حاصل ضرب (أو خارج قسمة) وحدة عيارية في (أو على) العدد 10 مرفوعا لقوة ما.

عدد عشري مختلط

decimal, mixed

عدد عُشري مضافا إليه عدد صحيح ومثاله 23.35

نظام الأعداد العشرية

decimal number system

نظام يستخدم الأساس 10 للأعداد الحقيقية ويمثل كل عدد حقيقي فيه

بمتتابعة من الأرقام 9, ...9... وعلامة (فاصلة) عَشرية موضوعة في مكان خاص بين الأرقام.

المنزلة العشرية

decimal place

موضع رقم ما في عدد عشري، فمثلا في العدد 0.456 يقع الرقم 4 في المنزلة العشرية الثانية والرقم 6 في المنزلة العشرية الثانية والرقم 6 في المنزلة العشرية الثالثة.

صحيح لمنزلة عشرية معينة

decimal place, accurate to a certain

(انظر: صحيح له من المراتب العشرية

(accurate to n decimal places

العلامة العشرية

decimal point

العلامة ". " الواقعة على يسار الكسر العشري.

علامة عشرية حرة

decimal point, floating

مصطلح في الحاسبات الآلية يستخدم عندما يكون موضع العلامة العَشرية غير ثابت وتوضع في مكانها المطلوب عند إجراء كل عملية.

عدد عَشري متكرر = عدد عَشري دوري

decimal, repeating = decimal, periodic

عدد عَشري إما منته أو لا منته ويحتوي علَى مجموعة محدودة من الأرقام تتكرر بلا توقف وبدون فواصل. مثال ذلك العدد

$$\frac{15}{28} = 0.53571428571428\cdots$$

والذي تتكرر فيه المجموعة 571428 ، وفيما عدا ذلك يكون العدد غير دوري. والعدد العشري الدوري يمثل عددا قياسيا. أما العدد العشري اللا منتهى وغير الدوري فيمثل عددا غير قياسي.

جمع الأعداد العشرية

decimals, addition of

(addition of decimals : انظر)

ضرب الأعداد العشرية

decimals, multiplication of

(product of two real numbers فيقيين عددين حقيقيين)

أعداد عشرية متشابهة

decimals, similar

أعداد عشرية تحتوى نفس عدد المنازل العشرية، مثل 2.361 ، 0.253 . وإذا كان العددان العشريان غير متشابهين فيمكن جعلهما متشابهين بإضافة عدد مناسب من الأصفار على يمين العدد الذي تكون منازله أقل. فمثلاً، يمكن أن يصبح العدد 0.360 مشابها للعدد 0.321 بكتابته على الصورة 0.360 .

ديسيمتر

decimeter

مقياس للأطوال في النظام المِتري يساوى $\frac{1}{10}$ من المتر.

قرار

decision

عملية يقوم بها الحاسب لتحديد وجود علاقة معينة بين كلمات في وحدة التخزين أو في السجلات لاتخاذ الطريق المناسب للعمل.

قرار منطقي

decision, logical

اختيار بين عدة احتمالات يعتمد على الرد سلبا أو إيجابا عن أسئلة رئيسية تتعلق بالتساوي والمقادير النسبية.

ميل نقطة سماويّة

declination of a celestial point

البُعد الزاوي لنقطة في السماء مقيساً على خط الطول المار بها، وإذا كانت النقطة أعلى خط الاستواء السماوي يقال إن الميل الزاوي لها شمالي ويؤخذ موجباً. أما إذا كانت النقطة أسفل خط الاستواء السماوي، فيقال أن الميل

الزاوي لها جنوبي ويؤخذ سالباً.

فاك الشكورة

decoder

جهاز يُستخدم لفك الشَقرة.

فك الشكرة

decoding

تحويل رسالة مشقرة إلى صورتها الأصلية.

فك كسر

decomposition of a fraction

تحويل كسر إلى كسوره الجزئية. فمثلا

$$\frac{2x+1}{x^2-1} = \frac{3}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} \quad \mathbf{9} \quad \frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

النقص المئوى

decrease, percent

عندما تنقص قيمة شئ من x إلى y ، فإن النقص المئوي هو $\frac{x-y}{x}$ 000 ، وإذا زادت القيمة من x إلى y ، فالزيادة المئوية (percent increase) عساوى $\frac{y-x}{x}$.

دالة تناقصية في متغير واحد

decreasing function of one variable

دالة تنقص قيمتها عندما تزداد قيمة المتغير المستقل. وإذا كانت الدالة تقبل التفاضل على فترة I فإنها تكون تناقصية على هذه الفترة إذا كانت المشتقة الأولى لها غير موجبة لجميع نقط I و لا تتلاشى في أي فترة من I . ويقال عادة لمثل هذه الدالة إنها مطلقة التناقص (strictly decreasing) لتمييز ها عن الدالة المطردة التناقص (monotonic decreasing). تكون الدالة f مطلقة التناقص في الفترة I إذا كان f(y) < f(x) لجميع f(y) < f(x) في f(y) < f(x) . وتكون الدالة مطردة التناقص في الفترة f(y) < f(x) . $f(y) \le f(x)$

متتابعة تناقصية

decreasing sequence

متتابعة مثر دة $x_i > x_j$ فيها $x_i > x_j$ عندما i < j . وتكون المتتابعة مطردة التناقص إذا كان $x_i \ge x_j$ عندما i < j عندما

إنقاص قِيم جذور معادلة

decreasing the roots of an equation

انقاص قِیَم جذور معادلة في مجهول x بمقدار a>0 باستخدام التعویض $x=\overline{x}+a$

والحصول على معادلة جديدة في \bar{x} .

فمثلاً، التعويض $x = \overline{x} + 2$ في المعادلة $x^2 - 3x + 2 = 0$ ، التي جذر اها $\overline{x}^2 + \overline{x} = 0$ ، يؤدى للحصول على المعادلة $\overline{x}^2 + \overline{x} = 0$ ، يؤدى للحصول على المعادلة $\overline{x}^2 + \overline{x} = 0$

النقص

decrement

الكمية التي ينقص بها متغير ما.

قطع "ديدكند"

Dedekind cut

تقسيم جزئي للأعداد القياسية إلى فئتين غير خاليتين ومنفصلتين B,A بحيث يتحقق ما يلي:

الطريقة أو النظرية الإستنتاجية

deductive method or theory

تركيب يعتمد على مجموعة من المسلمات ومجموعة من الأشياء غير المعرقة (اللا مُعرفات). وتعرق عناصر جديدة بدلالة اللا مُعرفات المعطاة، كما تُثبَت تقارير جديدة باستخدام المسلمات.

معادلة معيبة

defective equation

معادلة يحصل عليها من معادلة أخرى وعدد جذورها أقل من عدد جذور المعادلة الأصلية. مثال ذلك، إذا قسم طرفا المعادلة $x^2 + x = 0$ على $x^2 + x = 0$ يحصل على المعادلة المعيية x = 0 لأن x = 0 ليس جذراً لها رغم أنه جذر للمعادلة الأصلية.

عدد معيب

defective number = deficient number

عدد مجموع عوامله (فيما عدا العدد نفسه) أصغر منه. مثال ذلك العدد 35 عدد معيب حيث أن عوامله هي 1،5،7 ومجموعها 13 أصغر من 35

شيء مُعرّف

defined object

شيء محدَّد بخواص مميِّزة، فمثلا يعرَّف العدد بأنه موجب إذا كان أكبر من الصفر.

تكامل محدّد (معين)

definite integral

(integral, definite : انظر)

تكامل محدّد جزئى

definite integral, partial

(integral, partial definite) انظر:

صيغة تربيعية موجبة قطعأ

definite quadratic form, positive

(form, positive definite quadratic) انظر:

تعريف

definition

عبارة متفق عليها تدل على مفهوم رياضي معين. مثال ذلك، يُعرَّف المربع بأنه الشكل الرباعي المتساوي الأضلاع وجميع زواياه قوائم، أي أن كلمة مربع تستخدّم بديلاً للعبارة المطوّلة "الشكل الرباعي ... ".

تَشْكُل (في المرونة)

deformation (in Elasticity) التغير في مواضع النقط المادية المكوّنة لجسم ما تتغير على أثره الأبعاد بين

(strain الانفعال)

تَشْكُلُ (تشوه) متصل

deformation, continuous تحويل يؤدى إلى الانكماش، أو الالتواء، أو ما اليهما بأية طريقة خلاف القطع. T(p) المتصل المتصل B المي شي A المتصل A المتصل B المتصل المتصل المتصل للشئ A إلى الشئ B الذي توجد له دالة F(p,t) معرفة ومتصلة p للنقط $t \cdot p$ للنقط $t \cdot p$ النقط $t \cdot p$ للنقط المنتمية والم المحايد من A ، بحيث F(p,0) هو الرآسم المحايد من A إلى A ، اي F(p,0) = p وطبقاً لهذا التعريف يمكن $F(p,1) \cdot F(p,0) = p$ أن تؤول دائرة في المستوى بواسطة تَشْكُل متصل إلى نقطة.

نسسة التشكل

deformation ratio

في حالة الراسم الحافظ للزوايا، يكون التكبير عند نقطة ما بنفس القدر في جميع الاتجاهات، أي أن

 $ds^2 = \left[M(x,y)\right]^2 \left(dx^2 + dy^2\right)$

 $[M(x,y)]^2$ نسبة التَّشْكُل الخطى كما تسمى الدالة M(x,y)نسبة النَّشَكُّال المساحي. وإذا أعطى الراسم بالدالَّة التحليلية w=f(z) في المتغير المركب z ، فإن

M = |f'(z)|

قطوع مخروطية منحلة

degenerate conics

(conic sections

(انظر : قطوع مخروطية

المعادلة العامة من الدرجة النونية

degree, general equation of the nth-

(equation, polynomial

(انظر: معادلة كثيرة حدود

درجة منحني

degree of a curve

(algebraic plane curve

(انظر: منحنى مستو جبرى

درجة معادلة تفاضلية

degree of a differential equation

الأس المرفوع له الحد المتضمِّن أعلى رتبة للتفاضل في المعادلة، فمثلا درجة المعادلة التفاضلية

$$\left(\frac{d^4y}{dx^4}\right)^2 + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$$

هي الثانية.

differential equation, ordinary

(انظر: معادلة تفاضلية عادية

درجة امتداد حقل

degree of an extension of a field

(extension of a field انظر: امتداد حقل)

درجة كثيرة الحدود أو معادلة

degree of a polynomial or equation

أعلى أس موجود في معادلة أو كثيرة ألحدود، ودرجة أي حد في متغير واحد هي الأس المرفوع له هذا المتغير. ودرجة حد في أكثر من متغير هي مجموع أسس المتغيرات في هذا الحد، فمثلا 3x4 حد من الدرجة الرابعة، x حد من الدرجة السادسة، ولكنه من الدرجة الثانية في $7x^2yz^3$ والمعادلة $3x^4 + 7x^2yz^3 = 0$ من الدرجة السادسة، ولكنها تعتبر من الدرجة الرابعة في x ، ومن الدرجة الأولى في y ومن الدرجة الثالثة في z

درجة كُروية

degree, spherical

(spherical degree : انظر)

درجات الحرية (في الإحصاء)

degrees of freedom (in Statistics)

(freedom, degrees of : انظر)

تناظرات "ديلامبر"

Delambre's analogies

اسم آخر لصيغ "جاوس".

تنسب التناظرات إلى عالم الفلك الفرنسي "جان باتيست ديلامبر"

. (J. B. Delambre, 1822)

(Gauss' formulae "أنظر: صيغ "جاوس")

تأخير

delay

الفترة الزمنية بين الانتهاء من جمع البيانات وإعدادها للمعالجة وبين ظهورها في شكل تقارير.

تأخير تبايني

delay, differential

-----الفرق بين تأخيري أقصى تردد وأدناه في حزمة من الترددات.

خط تأخير = دائرة تأخير

delay line

دائرة تُحدِث تأخير ا مطلوبا عند نقل إشارة ما.

حرف مُحدِّد

delimiter

عنصر يمثل نهاية مجموعة من العناصر وليس واحدا منها.

المؤثر دِل

del operator

 $\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial v} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$

في الإحداثيات الديكارتية المتعامدة ويُرمز له بالرمز ∇ (nabla) . (انظر: ميل دالة gradient of a function ، تباعد دالة متجهة

(divergence of a vector function

توزيع دلتا

delta distribution

(distribution) انظر: توزیع

طريقة دلتا

delta method

(four-step rule الأربع) انظر: قاعدة الخطوات الأربع

نظرية "دى موافر"

De Moivre's theorem

النظرية التي تنص على

 $[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$: غيث r,θ الإحداثيان القطبيان القطة في المستوى، r,θ فمثلاً: $(\sqrt{2}+i\sqrt{2})^2 = [2(\cos 45^\circ+i\sin 45^\circ)]^2 = 4(\cos 90^\circ+i\sin 90^\circ) = 4i$ تنسب النظرية إلى العالم الفرنسي "ابر اهام دى مو افر "
(Abraham De Moivre, 1754).

صيغ "دى مورجان"

De Morgan formulae

الصيغتان

 $(A \cap B)^{'} = A' \cup B'$, $(A \cup B)' = A' \cap B'$ حيث B , A فئتان، S' مكملة الغئة B , A تنسب هاتان الصيغتان إلى عالم الرياضيات البريطانى "اوجُستس دى مورجان" (Augustus De Morgan, 1871)

نفی

denial = negation

(negation of proposition) انظر: نفى تقرير

عدد تعیینی

denominate number

عدد يعين كمية ما بدلالة وحدة من وحدات القياس، مثل 3 سنتيمتر، 2 كيلو جرام، وتجرى عمليات الجمع والطرح والضرب للأعداد التعيينية بنفس أسلوب إجراء هذه العمليات على الأعداد العادية (المجردة)، بشرط التعبير عن كل عدد بنفس الوحدة. فمثلا، إذا طلب عدد الأمتار المربعة في حجرة أبعادها خمسة أمتار وأربعون سنتيمتر، أربعة أمتار وعشرون سنتيمتر، يحول هذان البعدان أو لا إلى أمتار فيكونان 5.4 ، 4.2 على الترتيب، ويكون عدد الأمتار المربعة المطلوب هو 5.4 × 22.68

المقام

denominator

الحد الموجود أسفل علامة الكسر، أي الحد الذي يقسم عليه البسط، فمثلا مقام الكسر $\frac{2}{3}$ هو $\frac{2}{3}$

المقام المشترك الأصغر

denominator, least common

common denominator, least : انظر)

فئة كثيفة في نفسها

dense in itself, set

فئة كل جوار لأي نقطة من نقطها يحوى نقطة أخرى على الأقُل من نقط الفئة. مثال ذلك، فئة الأعداد القياسية.

فئة كثيفة

dense set

الفئة E في الفراغ M تكون كثيفة إذا كانت كل نقطة من نقط E هي نقطة من نقط E أو نقطة نهائية للفئة E وفيما عدا ذلك تكون الفئة غير كثيفة (nondense set) .

فئة غير كثيفة

dense set, nowhere = nondense set

(dense set فئة كثيفة)

كثافة

density

كتلة وحدة الحجم لمادة ما.

كثافة الحروف

density, character

عدد الحروف التي يمكن تخزينها على وحدة الطول في الحاسب.

دالة الكثافة

density function تسمى الدالة x دالة الكثافة للمتغير العشوائي x إذا كان احتمال f(x) وجود x في الفترة (a,b) يساوى $\int_a^b f(x) \, dx$ وبالتالي . $\int_a^\infty f(x) \, dx = 1$

الكثافة المتوسطة

density, mean

خارج قسمة كتلة جسم ما على حجمه ويُعبّر عنها بالصورة الأتية:
$$\int\limits_V \rho \ dV \div \int\limits_V dV$$

حيث p الكثافة، V الحجم.

الكثافة المترية

density, metric

(metric density : انظر)

الكتَّافَة السطحية لطبقة مزدوَجة = الكتَّافة السطحية لعزم طبقة مزدوَجة density of a double layer, surface = moment per unit area of a double layer

العزم لوحدة المساحات في حالة وجود طبقة متصلة من 'ثنائيات القطّب على السطح.

كثافة متتابعة أعداد صحيحة

density of a sequence of integers

إذا فرض أن $A=\{a_1,a_2,\dots\}$ متتابعة متز آيدة من الأعداد الصحيحة وكان F(n) عدد الأعداد الصحيحة التي لا تزيد عن n في هذه المتتابعة، فإن $1 \geq \frac{F(n)}{n}$ كثافة المتتابعة $1 \geq \frac{F(n)}{n}$ كثافة المتتابعة $a_1 \neq 1$ ويسمى أكبر حد أدنى للمقدار $a_1 \neq 1$ كثافة المتتابعة $a_1 \neq 1$ أو إذا كان $a_1 \neq 1$ أو إذا احتوت $a_1 \neq 1$ على عدد قليل جدا من الأعداد الصحيحة. مثال ذلك، إذا كان $a_1 \neq 1$ كانت $a_1 \neq 1$ متتابعة هندسية أو متتابعة أعداد أولية أو متتابعة مربعات أعداد صحيحة.

الكثافة السطحية للشحنة

density of charge, surface

الشُحنة الكهربائية على وحدة المساحات من سطح.

الكثافة الحجمية للشحنة

density of charge, volume

الشُحنة الكهربائية لوحدة الحجم.

كثافة الحزرم

density, packing

مقياس لكمية البيانات في وحدة المساحة من سطح التخزين في الحاسبات.

فئة قابلة للعدّ

denumerable set = countable set

(countable set) انظر:

افتراق خطًى طول

departure between two meridians

مدى افتراق خطّى طول عند خط عرض معين على سطح الأرض هو طول قوس خط العرض المحصور بين خطّى الطول ويكون مدى الافتراق أقصر كلما اقترب خط العرض من القطب.

منطقة الاعتماد

dependence, domain of

إذا كان لدينا مسألة قيم ابتدائية لمعادلة تفاضلية جزئية، فإنه يمكن تعيين قيمة الحل عند نقطة P وزمن t بمعرفة القيم الابتدائية على جزء فقط من المدى الكلى لهذه القيم، ويسمى هذا الجزء منطقة الاعتماد. فمثلاً، المعادلة الموجية

$$\frac{1}{c^2}u_{tt}=u_{xx}$$

بالشروط الابتدائية

$$u_{\iota}(x,0) = g(x)$$
, $u(x,0) = f(x)$

تتوقف قيمة الحل لها عند النقطة x والزمن t على القيم الابتدائية في الفترة [x-ct,x+ct] فقط.

معادلات مرتبطة

dependent equations

يقال إن مجموعة من المعادلات مرتبطة إذا كانت واحدة منها تتُحقق لكل فئة من قيم المجاهيل التي تحقق جميع المعادلات الأخرى. فمثلا إذا كان لدينا ثلاث معادلات خطية في مجهولين، فإن كلا من هذه المعادلات الثلاث يعتمد على المعادلتين الأخريين بشرط ألا ينطبق الخطان الممثلان لهاتين المعادلتين وأن تتلاقى الخطوط الثلاث في نقطة واحدة.

حدثان مرتبطان

dependent events

حدثان يعتمد كل منهما على الأخر.

دوال مرتبطة

dependent functions

مجموعة من الدوال يمكن التعبير عن إحداها كدالة في الدوال الأخرى. مثالً ذلك، الدالتان

$$v(x,y) = \sin \frac{x+1}{y+1}$$
, $u(x,y) = \frac{x+1}{y+1}$

 $v = \sin u$ أن يعتمد كل منهما على الأخرى، لأن

فئة مرتبطة خطيا

dependent set, linearly

يقال إن فئة من الأشياء $z_1, z_2, ..., z_n$ (قد تكون متجهات أو مصفوفات أو كثير ات حدود ...) مر تبطة خطياً على فئة معطاة إذا وجد تركيب خطى $a_1z_1+a_2z_2+...+a_nz_n$ يساوى الصفر، حيث $a_1, a_2, ..., a_n$ معاملات من الفئة المعطاة لا تتلاشى جميعها.

متغير تابع

dependent variable

(انظر: دالة صحيحة منطقة في متغير واحد

(function of one variable, rational integral

معادلة مخفضة

depressed equation

المعادلة التي تنشأ من خفض عدد جذور معادلة أخرى بقسمة هذه المعادلة على الفرق بين المجهول وأحد الجذور. فمثلاء المعادلة $x^2-2x+2=0$ هي المعادلة المخقصة التي يُحصل عليها من المعادلة $x^3-3x^2+4x-2=0$ بقسمة الأخيرة على (x-1).

زاوية الانخفاض

depression, angle of

(انظر: زاویة angle)

المشتقة

derivative

معدل التغير في دالة بالنسبة للمتغير. إذا كانت f دالة معلومة في متغير واحد x و كان x التغير في x و أحد x وكان x التغير في x وأن

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$$

$$\text{erize of limits in the proof of the proo$$

وإذا آلت $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ إلى نهاية عندما تؤول Δx إلى الصغر، فإن هذه النهاية تكون مشتقة الدالة f عند النقطة x . ومشتقة الدالة هي دالة أيضاً.

مشتقة اتجاهيه

derivative, directional

(directional derivative : انظر)

الاشتقاق (التفاضل) من معادلتين بارامتريتين

derivative from parametric equations

ایجاد المشتقة من معادلتین بار امتریتین. اذا کانت هاتان المعادلتان هما y = y(t) ، x = x(t)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt}$$

بشرط عدم تلاشى
$$\frac{dx}{dt}$$
 . مثال ذلك، إذا كان

$$y = \cos^2 t$$
, $x = \sin t$

فإن

$$\frac{dy}{dt} = -2\sin t \cos t \quad , \quad \frac{dx}{dt} = \cos t$$


$$\frac{dy}{dx} = -2\sin t \cos t$$
 , $\frac{d}{dt} = \cos t$ و بالتالي فإن $\frac{dy}{dx} = (-2\sin t \cos t):(\cos t) = -2\sin t$

تفسيرا المشتقة

derivative, interpretations of the

للمشتقة تفسيران خاصان هما:

AB هو ميل المماس للمنحنى. في الشكل $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ هو ميل المستقيم -1 رحلى ذلك، فنهاية هذه النسبة عندما تؤول Δx إلى الصفر هي ميل المماس للمنحنى عند A.



s(t) قيمة السرعة لنقطة مادية متحركة في خط مستقيم. إذا كانت - xالمسافة التي تقطعها النقطة في زمن t ، فإن مشتقة s عند $t=t_1$ هي قيمة سرعة النقطة عند الزمن $t=t_1$

المشتقة العمودية

derivative, normal

معدل تغيّر دالة في اتجاه العمودي لمنحنى أو لسطح ما.

مشتقة دالة في متغير مركب

derivative of a function of a complex variable

الدالة المركّبة f التي يتضمن مجالها جوارا للعدد المركّب z. تكون قابلة للاشتقاق عند $z=z_0$ إذا، وفقط إذا، وجدت النهاية

$$\lim_{z \to z_o} \frac{f(z) - f(z_o)}{z - z_o}$$

. z. عند f الدالة f عند z(انظر: دالة تحليلية في متغير مركب

analytic function of a complex variable

مشتقة من رتبة أعلى

derivative of a higher order

مشتقة لمشتقة أخرى حيث تعتبر الثانية دالة في المتغير المستقل مثلها مثل الدالة الأصلية التي حصل على مشتقتها الأولى. فمثلا المشتقة الأولئ للدالة y' = 6x هي $y' = 3x^2$ هي $y' = 3x^2$ هي $y = x^3$. $y^{(4)} = 0$, y''' = 6 exist $3x^2$

مشتقة تكامل

derivative of an integral

، x_o عند ومتصلة عند f ومتصلة عند f الفترة g x_o عند النقطة $\int_0^x f(t)dt$ عند النقطة $x_o \in (a,b)$ عند النقطة توجد وتعطى بالعلاقة

$$\frac{d}{dx}\int_{a}^{x}f(t)dt=f(x_{o})$$

x متصلة في متصلة في متصلة في متصلة في f(t,x) مشتقة جزئية f(t,x) مشتقة في الفترة المغلقة t_o وفي t وفي t وفي الفترة المغلقة t_o كنقطة $\frac{dF}{dt}$ موجودا، فإن المشتقة داخلية، وكان التكامل $\int_{0}^{t} f(t,x) dx = F(t)$ موجودا، توجد عند النقطة t_o وتعطى بالعلاقة $\frac{dF}{dt} = \int_{a}^{b} f_{i}(t, x) dx$

$$\frac{dF}{dt} = \int_{a}^{b} f_{t}(t, x) dx$$

المشيقة السفلية لممتد

derivative of a tensor, covariant

(covariant derivative of a tensor (انظر:

مشتقة متجه

derivative of a vector

إذا كان t هو بار امتر منحنى، وكان هناك متجّه V(t) لنقطة المنحنى التي يساوى البار امتر عندها t ، فإن النهاية

 $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{V}(t + \Delta t) - \mathbf{V}(t)}{t}$

هي مشتقة المتجه بالنسبة لبارامتر المنحنى عند النقطة t وذلك بشرط أن توجد هذه النهاية.

مشتقة حزئبة

derivative, partial

المشتقة العادية لدالة في متغيرين أو أكثر بالنسبة إلى أحد المتغير أت وباعتبار أن المتغيرات الأخرى توابت. إذا كان هناك المتغيران ٧, x ، فإن المشتقات الجزئية من الرتبة الأولي للدالة f(x,y) تكتب على الصورة

أو x^2+y المشتقة الجزئية للدالة $f_y(x,y), f_x(x,y)$ أو المشتقتان الجزئيتان للدالة y هي x هي x هي x وبالنسبة إلى yبالنسبة للمتغيرين y, x عند النقطة (a,b) هما ميلا المنحنيين (x,y)x=a ، y=b مع المستويين عن تقاطع السطح z=f(x,y)على الترتيب.

$$\frac{du(y)}{dx} = \frac{du(y)}{dy}\frac{dy}{dx}$$

التفاضل التام

derivative, total

(انظر: قاعدة السلسلة للتفاضل الجزئي

(chain rule for partial differentiation

قاعدة السلسلة للاشتقاق

derivatives, chain rule for

(chain rule

(انظر: قاعدة السلسلة

قواعد تعيين المشتقات

derivatives, formulae for evaluating

قواعد لإيجاد مشتقات الدوال، مثل

١- مشتقة مجموع عدة دوال هي مجموع مشتقات هذه الدوال.

 nx^{n-1} هي x^n - ۲

مشتقة دالة u(y) ، حيث y دالة في x ، تعطي بالصيغة (قاعدة – u(y)السلسلة)

منحنى مشتق

derived curve

المنحنى المشتق الأول لمنحنى معلوم هو المنحنى الذي يكون الإحداثي الصادي فيه هو ميل المنحنى الأول لنفس قيمة الإحداثي ي لكل من المنحنيين. مثال ذلك، المنحنى المشتق الأول للمنحنى $y=x^3$ هو المنحنى y = 6x و المنحنى المشتق الثاني هو $y = 3x^2$

معادلة مشتقة

derived equation

١- في الجبر: المعادلة التي يحصل عليها من معادلة أخرى بإضافة حدود إلى طرفيها، أو بتربيع الطرفين، أو بضربهما في عامل أو قسمتهما على كمية ما. والمعادلة المشتقة لا تكافئ دائما المعادلة الأصلية، أي ليس بالضرورة أن يكون للمعادلتين نفس الجذور.

٢- في حساب التفاضل والتكامل: المعادلة التي تنتج من تفاضل المعادلة

(derived curve منحنى مشتق)

فئة مشتقة

derived set

(انظر: مُغلِقة فئة من النقط closure of a set of points

نظرية "ديزارج"

Desargues theorem

نظرية تنص على أن المستقيمات التي تصل بين الرؤوس المتناظرة لمثلثين تتلاقى في نقطة واحدة إذا، وفقط إذا، وقعت نقط تقاطع الأزواج الثلاثة للأضلاع المتناظرة في المثلثين على خط مستقيم واحد. وضعها العالم الفرنسي "جيرار ديزارج" (Gérard Desargues, 1661).

منحنى "ديكارت" التكعيبي

Descartes, folium of

منحنى مستو تكعيبي يتكون من عروة وعقدة وفرعين لهما نفس الخط التقرُّبي. المعادلة الديكارتية لهذا المنحنى هي

 $x^3 + y^2 = 3axy$ ويتضح منها أن المنحنى يمر بنقطة الأصل وأن المستقيم $x^3 + y^2 = 3axy$ تقريبي له.

قاعدة "ديكارت" للإشارات

Descartes' rule of signs

قاعدة تحدد حدا أعلى لعدد الجذور الموجبة والسالبة لكثيرة حدود، وتنص على أن معادلة كثيرة الحدود f(x) = 0 يستحيل أن يكون عدد جذورها الموجبة أكبر من عدد تغير إشارات حدودها، كما يستحيل أن يكون عدد جذورها السالبة أكبر من الجذور الموجبة للمعادلة f(-x) = 0 . فمثلاً $x^4 - x^3 - x^2 + x - 1 = 0$ تتغیر إشارات حدودها ثلاث مــرات f(-x) = 0 ويستحيل أن يكون لها أكثر من ثلاثة جذور موجبة. وحيث أن تأخذ الصورة $x^4 + x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ التي تتضمن تغييرا واحدا في إشارات الحدود، فلا يمكن أن يكون للمعادلة الأصلية أكثر من جــــذر ســـالب واحـــد، وتنص قاعدة ديكارت للإشارات في صورتها العامة على أن عدد الجذور الموجبة لمعادلة معاملاتها حقيقية إما أن يساوى عدد التغيرات فـــى إشــارات الحدود أو أن يكون اقل منه بعدد زوجي، وذلك على أساس حساب الجذر المكرر m من المرات على أنه m من الجذور.

زمن السقوط

descending time

الزمن الذي يستغرقه سقوط جسم من نقطة ما إلى سطح الأرض.

معاملات منفصلة

detached coefficient

(division, synthetic أنظر: قِسمة تأليفية)

قاعدة الفصل (في المنطق)

detachment, rule of (in Logic)

إذا كان كل من المتضمَّن (implication) وعنصر الشرط (antecedent) صحيحين فإن الناتج التالي (consequent) يكون صحيحاً. مثال ذلك، إذا كانت العبارة: "إذا خسر فريقي المباراة فسأقطع ذراعي" والعبارة "خسر فريقي" صحيحتين، تكون العبارة "سأقطع ذراعي" صحيحة. ويعبر عن ذلك رياضيا على الصورة

 $[(a \Rightarrow b) \land a] \Rightarrow b$

ملف التحديث

detail file

ملف يتضمن معلومات جارية أو متغيرة ويُستخدم لتحديث معلومات الملف الرئيسي.

محدّد

determinant

مجموعة من الحدود، تسمى العناصر، متراصة على هيئة مربع، وعدد الصفوف (أو الأعمدة) هو رتبة المحدّد. ويسمى القطر من أعلى عنصر على اليسار إلى اسفل عنصر على اليمين القطر الرئيسي. المحدّد $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ هو من الرتبة الثانية ويَرْمُز للمقدار $(a_1b_2-a_2b)$ ، والمحدّد

 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

هو من الرتبة الثالثة ويَرْمُز للمقدار

 $(a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_1b_3c_2 - b_1c_3a_2 - c_1a_3b_2)$

وهكذا. ويُرمز للعنصر في الصف رقم m والعمود رقم n بالرمز a_{mn} . وهناك قواعد لفك المحدّد من الرتبة r بدلالة محيددات من الرتبة r .

حاصل ضرب محدّد في عدد

determinant by a scalar, multiplication of a حاصل ضرب المحدِّد في العدد. و هو يكافئ ضرب أحد أعمدة أو الحدد. المحدِّد في العدد.

محيدد عنصر في محدّد

determinant, cofactor of an element in a

m إذا كان a_{mn} أحد عناصر محدِّد رتبته r وحذفنا الصف رقم r-1 والعمود رقم n من هذا المحدِّد، ينتج محدِّد جديد من رتبة n ويسمى محيد العنصر n .

عنصران مترافقان في محدّد

determinant, conjugate elements of a

يقال للعنصرين a_{nm} و a_{nm} إنهما عنصران مترافقان في المحدّد.

محدّد "فردهولم" (في المعادلات التكاملية)

determinant, Fredholm's (in Integral Equations)

(Fredholm's determinant) انظر:

محدّد دالی

determinant, functional

(انظر: جاكوبي عدد من الدوال في عدد مساو من المتغيرات Jacobian of a number of functions in as many variables

محدّد "جرام"

determinant, Gram

(Gramian الجراماني)

مفكوك "لابلاس" لمحدّد

determinant, Laplace's expansion of a مفكوك يعبر عن محدّد باستخدام المحدّدات الأصغر التي يتضمنها المحدّد الأصلى.

محدّد عددی

determinant, numerical

محدّد عناصره أعداد.

محدّد مصفوفة

determinant of a matrix

(matrix) انظر: مصفوفة

محدّد معاملات مجموعة من المعادلات الخطية

determinant of the coefficients of a set of linear equations محدّد المعاملات لفئة من المعادلات الخطية عددها n هو المحدّد الذي عنصره الموجود في الصف رقم m والعمود رقم n هو معامل المتغير الذي ترتيبه n في المعادلة التي ترتيبها m ، وذلك بشرط كتابة المتغيرات بنفس الترتيب في جميع المعادلات. ولا يوجد هذا المحدّد إذا اختلف عدد المجاهيل. فمثلاً، محدّد معاملات المعادلات عن عدد المجاهيل. فمثلاً، محدّد معاملات المعادلتين:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{vmatrix}$$
 see $4x - 7y + 5 = 0$ $2x + 3y - 1 = 0$

محدد متخالف التماثل

determinant, skew-symmetric محدّد عناصره المترافقة متساوية في المقدار ومختلفة في الإشارة، أي أن $a_{mn} = -a_{nm}$ لكل n, m . وتكون قيمة المحدّد التخالفي التماثل الفردي الرتبة هي الصفر.

محدّد متماثل

determinant, symmetric a_{nm} فطره الرئيسي، أي أن عناصره المترافقة محدّد عناصره متماثلة حول قطره الرئيسي، n و n تتساوى لكل n و n

محدّد "فاندرمونْد"

determinant, Vandermonde محدّد كل عنصر في الصف الأول منه هو الواحد، وعناصر الصف الثاني اختيارية، وعناصر الصف r هي العناصر المناظرة في الصف الثاني مرفوعة إلى القوة r-1 حيث $r\geq 1$. مثال ذلك، المحدّد

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

العمليات الأولية على المحدّدات

determinants, elementary operations on

(انظر: العمليات الأولية على المحدّدات أو المصفّوفات

(elementary operations on determinants or matrices

مفكوك المحددات بدلالة محيدداتها

determinants, expansion by minors of

مفكوك المحدّد من رتبة ٢ بدلالة محيدداته من رتبة ١-١ وذلك باستخدام عناصر صف (أو عمود) معين كمعاملات. وهذا المفكوك يساوى مجموع حواصل ضرب عناصر الصف (أو العمود) في محيدداتها مأخوذة بالإشارة المناسبة، أي يساوي مجموع حواصل ضرب عناصر الصف (أو العمود) في عواملها المرافقة. مثال ذلك، مفكوك المحدّد

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

(انظر: العامل المرافق لعنصر في محدد

(cofactor of an element of a determinant

حاصل ضرب محدّدين من نفس الرتبة

determinants of the same order, product of two

حاصل ضرب المحدِّدين، وهو محدِّد آخر من نفس الرتبة عنصره في الصف الرائي والعمود الميمي هو مجموع حواصل ضرب عناصر الصف الرائي في المحدِّد الأول في العناصر المناظرة للعمود الميمي من المحدِّد التَّاني. فمثلا،

$$\begin{vmatrix} a & b & e & f \\ c & d & g & h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{vmatrix}$$

الغلاف القطبي لمنحنى فراغي

developable of a space curve, polar

فئة جميع نقط الخطوط القطبية للمنحنى الفراغي.

سطح قابل للاستواء

developable surface

غلاف مجموعة من المستويات ذات بارامتر واحد. وهو سطح يمكن تكوينه أو بسطه على مستو بدون انكماش أو امتداد، والانحناء الكلى لمثل هذا السطّح

المنحرف القياسي (في الإحصاء)

deviate, standard (in Statistics)

l (in Statistics) المنحرف القياسي لقيمة معينه
$$x_1$$
 للمتغير x هو $\frac{x_1 - \overline{x}}{\sigma}$

حيث $\sigma \cdot \overline{x}$ المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري للمتغير x على الترتيب.

متوسط الانحراف المطلق

deviation, absolute mean

المتوسط الحسابي للقيم العددية للانحرافات ويعبر عنه في حالة المتغيرات المتصلة بالصيغة:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x - E(x)| n(x) dx$$
 وفي حالة المتغير ات غير المتصلة بالصيغة
$$\sum_{r=1}^{n} \frac{|x_r - E(x_r)|}{n}$$
 حيث n دالة التردد $E(x)$ القيمة المتوقعة المتوقعة

x القيمة المتوقعة للمتغير $E\left(x
ight)$ دالة التردد ، $E\left(x
ight)$

انحراف جبرى (في الإحصاء)

deviation, algebraic (in Statistics)

انحراف مأخوذ بالإشارة المناسبة فيكون موجبا إذا كان المقدار أكبر من المتوسط أو المتوقع وسالبا إذا كان أصغر منه.

انحر اف مته سط

deviation, mean

الانحراف المتوسط للكميات
$$x_r$$
 ($r=1,2,3,...$) يعطى بالعلاقة
$$\sum_{r=1}^{n} \frac{x_r - \overline{x}}{n}$$
حيث \overline{x} المتوسط الحسابي.

انحراف محتمل

deviation, probable

الانحراف المتوقع لمتغير عشوائي باحتمال $\frac{1}{2}$.

انحراف ربعى

deviation, quartile

نصف الفرق بين المقدارين الربعيين. (انظر: ربعي quartile)

انحراف معياري

deviation, standard = root mean square deviation

الانحراف المعياري لمتغير عشوائي (أو لدالة توزيعه) هو الجذر التربيعي الموجب للتباين.

(variance (انظر: تباین)

أداة تناظرية

device, analogue

أداة تمثل فيها الأرقام بكميات طبيعية كفرق الجهد أو التيار الكهربائي كما في حالة جهاز التحليل التفاضلي أو الحاسب التناظري.

منحنى يميني عند نقطة

dextrorosum=dextrorse curve at a point=right-handed curve at a point

منحنى موجه انحناؤه سالب عند نقطة ما.

تشخيص

diagnosis

عملية كشف الأخطاء وعزلها.

قطر المحدّد

diagonal of a determinant

(determinant محدّد)

قطر أساسى لمصفوفة

diagonal of a matrix, principal

القطر الذي تمتد عناصره من العنصر a_{11} وينتهي عند العنصر a_{n1} في مصفوفة مربعة رتبتها n .

قطر ثانوى لمصفوفة

diagonal of a matrix, secondary

القطر الذي يبدأ من العنصر $a_{\rm ln}$ وينتهي عند العنصر في مصفوفة مربعة.

قطر مُضلَع

diagonal of a polygon

١ في الهندسة العادية القطعة المستقيمة التي تصل بين رانسين غير متجاورين المضلع.

لهندسة الإسقاطية الخط المستقيم المار برأسين غير متجاورين للمُضلع.

قطر متعدد الأوجه

diagonal of a polyhedron

القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسين من رؤوس متعدد الأوجه غير واقعين في وجه واحد له.

رسم بیانی (مخطط)

diagram

رسم يمثل فئة من البيانات أو يمثل برهانا لنظرية ما.

مخطّط (شكل) "أرجاند"

diagram, Argand

(Argand diagram : انظر)

مخطّط (شكل) تبياني

'diagram, indicator

مخطَّط يربط بين كميتين طبيعيتين ويستنتج منه قيم كميات طبيعية أخرى. مثال ذلك منحنى السرعة والزمن الذي تستنتج منه المسافة المقطوعة والعجلة وكذلك منحني القوة والمسافة الذي يُستنتج منه الشغل المبذول.

قطر السطح التربيعي المركزي

diameter of a central quadric surface

المحل الهندسي لمراكز مقاطع متوازية للسطح المركزي، وهذا المحل الهندسي خط مستقيم.

قطر دائرة

diameter of a circle

(circle انظر: دائرة)

قطر قطع مخروطي

diameter of a conic

(conic, diameter of a : انظر)

قطر فئة من النقط

diameter of a set of points

(bounded set of points لنظر: فئة محدودة من النقط)

قطران مترافقان

diameters, conjugate

(conjugate diameters : انظر)

خط قطري لقِطع مخروطي = قطر قِطع مخروطي

diametral line in a conic = diameter of a conic

(conic, diameter of a : انظر)

مستوى قطري لسطح تربيعي

diametral plane of a quadric surface

مستوى يحوى منتصفات فئة من الأوتار المتوازية للسطح التربيعي.

مستويان قطريان مترافقان

diametral planes, conjugate

مستويان قطريان لسطح مخروطي مركزي كل منهما يوازي فئة الأوتار المحدّدة للآخر.

مسألة "ديدو"

Dido's problem

مسألة تتناول إيجاد المنحنى المقفل المحدّد طول محيطه والذي يحصر أكبر مساحة، ومن الثابت أن هذا المنحنى هو دائرة. وإذا كان جزء من المنحنى المطلوب قطعة مستقيمة محددة الطول، فإن المنحنى الناتج هو نصف دائرة. ويقال أن ديدو ملكة قرطاج كانت على علم بحل هذه المسألة.

الفرق = الباقى

difference = remainder

نتيجة طرح كمية من أخرى.

معادلة فرقية

difference equation

(انظر: معادلة فرقية عادية difference equation, ordinary انظر أيضا: معادلة فرقية جزئية difference equation, partial)

معادلة فرقية خطية

difference equation, linear

معادلة فروق فيها جميع المقادير f(x), $\Delta f(x)$, $\Delta^2 f(x)$,..., المقادير المقادية فروق فيها جميع الدرجة الأولى. فمثلاً، المعادلة f(x+1) = x f(x) من الدرجة الأولى. فمثلاً، المعادلة فروق خطية.

رتبة معادلة فرقية عادية

difference equation, order of an ordinary (قام أعلى فرق في المعادلة (أو أس أعلى قوة للمؤثر (E)).

معادلة فرقية عادية

difference equation, ordinary

علاقة بين متغير مستقل x ومتغير واحد أو أكثر من المتغيرات التابعة g و g و g و g و g و g هي أيضاً نتائج التطبيقات المتتالية للمؤثر g ، حيث g التطبيقات g المتتالية g g g ، حيث g

معادلة فرقية جزئية

difference equation, partial

علاقة بين اثنين أو أكثر من المتغيرات المستقلة x و y و z وواحد أو أكثر من المتغيرات التابعة f(x,y,z,...) و ... والفروق الجزئية لهذه المتغيرات التابعة.

قابلية تحليل فرق كميتين مرفوعتين لنفس القوة

difference of like powers of two quantities, factorability of إذا كانت القوة فردية، فإن الفرق بين كميتين مرفوعتين لها يقبل القسمة على الفرق بين الكميتين. وإذا كانت القوة زوجية فإن الفرق يكون قابلاً للقسمة على كل من مجموع الكميتين والفرق بينهما. فمثلاً

$$x^4 - y^4 = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$$
 $(x^3 - y^3) = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

الفرق بين فئتين

difference of two sets

الفرق A-B بين الفئتين A B هو فئة جميع العناصر التي تنتمي إلى الفئة A و لا تنتمي إلى الفئة B .



الفرق المتماثل لفئتين

difference of two sets, symmetric

الفرق المتماثل بين الفئتين A ، B هو فئة جميع العناصر التي ينتمي كل منها لواحدة من الفئتين B ، A و B و B ينتمي للأخرى، أي أنه اتحاد الفئتين B-A ، A-B و B-A ، A-B و B-A ، A-B

خارج قسمه الفروق (متوسط التغير)

difference quotient

خارج قسمه التغير في قيمة الدالة المناظر لتغير في المتغير المستقل على هذا الأخير، مثال ذلك، إذا كانت الدالة $f(x)=x^2$ هي $f(x)=x^2$ ، فإن متوسط التغير يكون

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

الفروق المحدودة

differences, finite

الفروق الناتجة من متتابعة القيم التي يحصل عليها من دالة معينة بالسماح للمتغير المستقل بالتغير خلال متتابعة حسابية. إذا كانت الدالة المعطاة هي f فإن المتتابعة الحسابية

$$\{a,a+h,a+2h,\dots\}$$

تعطى متتابعة القيم

 $\{f(a), f(a+h), f(a+2h), ...\}$

ر ... وفروق الرتبة الأولى هي

 $\{f(a+h) - f(a), f(a+2h) - f(a+h), ...\}$ و تكتب الفروق المتتالية من الرتبة الأولى والثانية والثالثة ، ... على الصورة $\Delta f(x), \Delta^2 f(x), \Delta^3 f(x), ...$

فروق الرتبة الأولى

differences, first order

المتتابعة الناتجة من طرح كل حد من حدود متتابعة من الحد التالي له مباشرة. فروق الرتبة الأولى للمتتابعة $\{...,2,2,2,\ldots\}$

الفروق الجزئية

differences, partial

الفروق الجزئية لدالة f(x,y,z,...) في متغيرين أو أكثر هي أي من التعبيرات التي تنتج من الاشتقاق المتتالي للفروق العادية مع اعتبار أن المتغيرات جميعا، عدا واحد منها، ثابتة في كل خطوة.

فروق من الرتبة

differences, rth-order

فروق الرتبة الأولى للفروق من الرتبة (r-1). فروق الرتبة الأولى للمتتابعة

$$\{a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n,\ldots\}$$

$$\{a_2-a_1,a_3-a_2,a_4-a_3,\ldots\}$$

$$\{a_3-2a_2+a_1\ ,\ a_4+2a_3+a_2,\ldots\}$$

$$\{a_3-2a_2+a_1\ ,\ a_4+2a_3+a_2,\ldots\}$$

$$\{a_1-a_1-a_1+a_1-a_2,\ldots\}$$

$$\{[a_{r+1}-ra_r+\frac{r(r-1)}{r}a_{r+1}-\ldots\pm a_1]\ ,\ [a_{r+2}-ra_{r+1}+\frac{r-1}{2}a_r-\ldots\pm a_2],\ldots\}$$

فروق الرتبة الثانية

differences, second order

فروق الرتبة الأولى للمتتابعة التي تمثل فروق الرتبة الأولى للمتتابعة الأصلية. مثال ذلك فروق الرتبة الأولى للمتتابعة $\{1,2,4,7,11,\dots\}$ هي $\{1,2,3,4,\dots\}$ ، وفروق الرتبة الثانية لها هي $\{1,1,1,1,\dots\}$.

الفروق الجدولية

differences, tabular

الفروق بين القيم المنتالية المسجلة في جدول لدالة ما. فمثلاً، الفروُق الجدولية لجدول لوغاريتمات هي الفروق بين الأجزاء العشرية المتتالية من اللوغاريتم والتي تسجل عادة في عمود بمفردها، والفروق الجدولية لجدول حساب المثلثات هي الفروق بين القيم المتتالية المسجلة لدالة مثلثية.

تفريق الدالة

differencing of a function

أخذ الفروق المتتالية لقيم الدالة. (انظر : finite differences)

قابل للاشتقاق

differentiable

تكون الدالة في متغير واحد قابلة للاشتقاق عند نقطة ما إذا كانت لها مشتقة عند هذه النقطة، وتكون الدالة في أكثر من متغير قابلة للاشتقاق عند نقطة ما إذا كانت لها مشتقات جزئية متصلة عند هذه النقطة.

تفاضكة

differential

إذا كانت f(x) دالة في متغير واحد لها مشتقة أولى f'(x) فإن تفاضلتها هي

df = f'(x) dx

dx,x حيث x المتغير المستقل. أي أن df تكون دالة في المتغيرين dx,x وحيث أن مشتقة x هي الواحد، فإن تفاضلة x تساوى dx

محلِّل تفاضلي

differential analyzer

آلة تستخدم لحل المعادلات التفاضلية بطريقة ميكانيكية.

محلّل " بوش " التفاضلي

differential analyzer, Bush

أول محلّل تفاضلي صمم سنة 1920 وقد بنى على عمليتي الجمع والتكامل الأساسيتين اللتين تجريان على التعاقب. ابتكره المهندس الأمريكي "فانيفر بوش" (Vannevar Bush, 1974).

تفاضلة ذات حدين

differential, binomial

binomial differential :))

حساب التفاضل

differential calculus

calculus, differential (انظر :)

معامل تفاضلى=مشتقة

differential coefficient = derivative

(derivative) انظر:

مرافقة معادلة تفاضلية

differential equation, adjoint of a

(adjoint differential equation

(انظر: معادلة تفاضلية مرافقة

الدالة المتممة للمعادلة التفاضلية الخطية العامة

differential equation, complementary function of a general linear

مجموع حاصل ضرب كل من الحلول المستقلة خطيا للمعادلة المتجانسة

L(y) = 0 في ثابت اختياري.

(انظر: المعادلة التفاضلية الخطية العامة

(differential equation, general linear

معادلة تفاضلية تامة

differential equation, exact

معادلة تفاضلية يحصل عليها بمساواة التفاضل التام لدالة ما بالصفر. ويمكن وضع هذا النوع من المعادلات في متغيرين على الصورة:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right]dx + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right]dy = 0$$

والشرط الضروري والكافي لكي تكون معادلة على الصورة

Mdx + Ndy = 0

حيث M و N لهما مشتقات جزئية متصلة من الرتبة الأولى، تامة هو $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

فمثلا المعادلة: (2x+3y)dx + (3x+5y)dy = 0 هي معادلة تفاضلية تامة. إذا كانت المعادلة التفاضلية في ثلاثة متغيرات على الصورة Pdx + Ody + Rdz = 0

حيث الدوال P و Q و R لها مشتقات جزئية متصلة من الرتبة الأولى، فإن الشرط الكافي واللازم لكي تكون المعادلة تامة هو الأولى، فإن الشرط الكافي واللازم $\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$, $\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

ويمكن تعميم هذا للمعادلات التفاضلية في أي عدد من المتغيرات.

المعادلة التفاضلية الخطية العامة

differential equation, general linear

معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى في y ومشتقاتها، حيث معاملات y دوال في x فقط، أي أنها معادلة على الصورة

$$L(y) = p_o \frac{d^n y}{dx^n} + p_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots p_n y = Q(x)$$

ويحصل على الحل العام لهذه المعادلة بإيجاد n من الحلول المستقلة خطيا للمعادلة المتجانسة L(y)=0 ، وضرب كل من هذه الحلول ببار امتر

اختياري، وإضافة مجموع هذه المضروبات إلى حل خاص للمعادلة التفاضلية الأصلية. وتسمى المعادلة

L(y) = 0

المعادلة المساعدة (auxiliary equation) أو المعادلة المختزلة (reduced equation)

 $L\left(y\right) =Q\left(x\right)$

المعادلة الكاملة (complete equation) .

الحل العام لمعادلة تفاضلية

differential equation, general solution of a حل للمعادلة التفاضلية يكون فيه عدد الثوابت الاختيارية الأساسية مساويا رتبة المعادلة التفاضلية.

معادلة تفاضلية متجانسة

differential equation, homogeneous

اسم يطلق على المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى والدرجة الأولى المتجانسة في المتغيرات مع عدم أخذ مشتقات المتغيرات في الاعتبار، مثل

$$\frac{x}{y} + \left(\sin\frac{x}{y}\right)\frac{dy}{dx} = 0 , y^2 + \left(xy + x^2\right)\frac{dy}{dx} = 0$$

ويحل هذا النوع من المعادلات باستخدام التعويض y=x v . ويمكن اختز ال المعادلات من النوع

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{ex + fy + g}$$

الى معادلات متجانسة باستخدام التعویض y = Y + k, x = X + h حیث k, h

معادلة تفاضلية خطية متجانسة

differential equation, homogeneous linear

معادلة تفاضلية خطية لا تحوى حدا يتضمن المتغير المستقل فقط. مثال ذلك، المعادلة

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

معادلة تفاضلية قابلة للتكامل

differential equation, integrable

معادلة تفاضلية تامة أو يمكن تحويلها إلى همعادلة تفاضلية تامةً.

معادلة تفاضلية خطية من الرتبة الأولى

differential equation, linear first order

معادلة على الصورة

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

و لهذه المعادلة معامل تكامل على الصورة: e

معادلة تفاضلية جزئية خطية

differential equation, linear partial

معادلة تفاضلية جزئية تتضمن المتغيرات التابعة ومشتقاتها الجزئية من الدرجة

معادلة "بسل" التفاضلية

differential equation of Bessel

(Bessel's differential equation) انظر:

معادلة "كلبرو" التفاضلية

differential equation of Clairaut

(Clairaut's differential equation : انظر)

معادلة "جاوس" التفاضلية = المعادلة التفاضلية فوق الهندسية

differential equation of Gauss = hypergeometric differential equation

المعادلة التفاضلية

$$x(1-x)\frac{d^{2}y}{dx^{2}} + \left[c - (a+b+1)x\right]\frac{dy}{dx} - aby = 0$$

و عندما يكون (|x|<1) فإن الحل العام (القيم $c \neq 1,2,3$ وعندما يكون $y = c_1 F(a,b;c;x) + c_2 x^{1-c} F(a-c+1,b-c+1;2-c;x)$ حيث F(a,b;c;x) هي الدالة فوق الهندسية.

معادلة "هرميت" التفاضلية

differential equation of Hermite

المعادلة التفاضلية

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0$$

حيث α ثابت.

معادلة "لاجير" التفاضلية

differential equation of Laguerre

المعادلة التفاضلية

$$xy'' + (1-x)y' + \alpha y = 0$$

حيث α ثابت.

معادلة "لابلاس" التفاضلية

differential equation of Laplace

المعادلة التفاضلية الجزئية في الإحداثيات الديكارتية المتعامدة x,y,z :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

وبدلالة الإحداثيات الأسطوانية (ρ, ϕ, z) والإحداثيات القطبية الكروية

تأخذ المعادلة على الترتيب الصورتين (r, θ, φ)

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial \rho^{2}} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\partial^{2} u}{\partial z^{2}} + \frac{1}{\rho^{2}} \frac{\partial^{2} u}{\partial \varphi^{2}} = 0$$

$$\frac{1}{r^{2}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{2} \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^{2} \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^{2} \sin^{2} \theta} \frac{\partial^{2} u}{\partial \varphi^{2}} = 0$$

معادلة "ليجندر" التفاضلية

differential equation of Legendre

(Legendre differential equation) انظر:

معادلة "ماثيو" التفاضلية

differential equation of Mathieu

المعادلة التفاضلية

$$y'' + (a + b \cos 2x)y = 0$$
 ويمكن كتابة الحل العام لهذه المعادلة على الصورة $y = c_1 e^{rx} \varphi(x) + c_2 e^{-rx} \varphi(-x)$. 2π ولدالة دورية $\varphi(x)$ دورتها r

معادلة "شتورم" و "ليوفيل" التفاضلية

differential equation of Sturm-Liouville

معادلة تفاضلية على الصورة

$$\frac{d}{dx}\left[r(x)\frac{dy}{dx}\right] + \left[q(x) + \lambda p(x)\right]y = 0$$

حيث p(x), q(x), p(x) دوال متصلة للمتغير p(x), p(x), متغير وسيط اختياري.

معادلة "تشيييشيف" التفاضلية

differential equation of Tchebycheff

المعادلة التفاضلية

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} + n^2y = 0$$

رئبة معادلة تفاضلية عادية

differential equation, order of an ordinary رُبّبة أعلى مشتقة تظهر في المعادلة التفاضلية. وتكتب عادة المعادلة التفاضلية من الربّبة الأولى بدلالة التفاضلات، وذلك مسموح به لأنه يمكن معالجة المشتقة الأولى كخارج قسمة تفاضلات. فمثلا المعادلة $y \frac{dy}{dx} + 2x = 0$ من الربّبة الأولى يمكن أن تكتب على الصورة

$$ydy + 2xdx = 0$$

رتبة معادلة تفاضلية جزئية

differential equation, order of a partial أعلى رُتبة للمشتقة الجزئية في المعادلة التفاضلية الجزئية.

معادلة تفاضلية عادية

differential equation, ordinary معادلة تحتوى على متغيرين على الأكثر ومشتقات من الرتبة الأولى أو الرتب الأعلى لأحد المتغيرين بالنسبة للمتغير الآخر. مثال ذلك المعادلة

$$y\frac{dy}{dx} + 2x = 0$$

معادلة تفاضلية جزئية

differential equation, partial

معادلة تفاضلية تتضمن أكثر من متغير مستقل ومشتقات جزئية بالنسبة الهذه المتغيرات. مثال ذلك، المعادلة

$$\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial y} = f(x, y, \omega)$$

حل خاص لمعادلة تفاضلية

differential equation, particular solution of a حل للمعادلة التفاضلية ينتج من إعطاء قيم للثوابت الاختيارية في الحل العام للمعادلة.

حل أولى لمعادلة تفاضلية

differential equation, primitive of a

(differential equation, solution of a

(انظر: حل معادلة تفاضلية

حل مفرد لمعادلة تفاضلية

differential equation, singular solution of a حل لا ينتج عن تخصيص قيم خاصة للبار امترات في الحل العام، وهو معادلة الغلاف لعائلة المنحنيات التي يمثلها الحل العام.

حل معادلة تفاضلية = تكامل أولًى

differential equation, solution of a =primitive integral و $y=x^2+cx$ فيها. فمثلاً: $y=x^2+cx$ فيها. فمثلاً: $x\frac{dy}{dx}-x-y=0$ مقدار ثابت يسمى الثابت الاختيارى.

طريقة "بيكارد" لحل المعادلات التفاضلية

differential equations, Picard's method for solving طريقة لإيجاد حل المعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

الذي يمر بالنقطة (x_0, y_0) بتحويل المسألة إلى الصورة التكاملية المكافئة

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t)) dt$$
 ثم إيجاد الحل بو اسطة التقريبات المتتالية.

طريقة "رونج و كوتا" لحل المعادلات التفاضلية

differential equations, Runge-Kutta method for solving

طريقة تقريبية لحل المعادلات التفاضلية. فمثلاً، للحصُول على حل تقريبي المعادلة

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y)$$

يمر بالنقطة (x_0,y_0) توضع $x_1=x_o+h$ ويُحصل على قيمة تقريبية $y_1=y_0+k$

$$k_{1} = h.f(x_{0}, y_{0}),$$

$$k_{2} = h.f(x_{0} + \frac{1}{2}h, y_{0} + \frac{1}{2}k_{1}),$$

$$k_{3} = h.f(x_{0} + \frac{1}{2}h + y_{0} + \frac{1}{2}k_{2}),$$

$$k_{4} = h.f(x_{0} + h, y_{0} + k_{3}),$$

$$k = \frac{1}{6}(k_{1} + 2k_{2} + 2k_{3} + k_{4})$$

ويكرر هذا الأسلوب بدءا بالنقطة (x_1,y_1) . وهذه الطريقة، التي تــؤول الــي طريقة سمسون إذا كانت f دالة في x فقط، يمكن تعميمها للحصول علــي الحل التقريبي لمجموعة المعادلات النفاضلية الخطية وعلى الحـــل التقريبي للمعادلة النفاضلية الخطية العامة.

معادلات تفاضلية آنية = مجموعة معادلات تفاضلية

differential equations, simultaneous = system of differential equation

معادلتان أو أكثر من المعادلات التفاضلية تحوى العدد نفسه من المتغيرات ماخوذة كمجموعة، والمطلوب هوالبحث عن الحلول التي تحقق هذه المعادلات آنيا.

معادلات تفاضلية عادية منفصلة المتغيرات

differential equations with separable variables, ordinary معادلة تفاضلية عادية يمكن كتابتها على الصورة

M(x)dx + N(y)dy = 0

وذلك بتطبيق عمليات جبرية على المعادلة المعطاة، وينتج حلها العام بالتكامل المباشر.

صيغة تفاضلية

differential form

كثيرة حدود متجانسة في التفاضلات. فمثلاً، إذا كان $A_{r_1r_2...r_n}$ مجالاً ممتدياً سفلياً متماثلاً، وكان $B_{s_1s_2...s}$ مجالاً ممتدياً سفلياً تخالفي التماثل، فإن $B_{s_1s_2...s}$ $dx^{s_1}dx^{s_2}...dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}dx^{s_n}$ $dx^{s_n}dx^$

هندسة تفاضلية

differential geometry علم دراسة خواص الأشكال الهندسية في جوار أحد عناصرها العامة.

هندسة تفاضلية مقياسية

differential geometry, metric دراسة خواص العناصر العامة للمنحنيات والسطوح اللا متغيرة تحت تأثير الحركة وذلك باستخدام حساب التفاضل.

هندسة تفاضلية إسقاطية

differential geometry, projective فرع دراسة الخواص التفاضلية للأشكال اللا متغيرة تحت تأثير التحويلات الإسقاطية.

تفاضئة وسيطة

differential, intermediate

اذا كانت
$$u = f(x,y,z)$$
 وكانت $u = f(x,y,z)$ دالة في المتغيرين $u = f(x,y,z)$ اذا كانت $du = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y}\right) dy$

ويسمى كل من الحدين

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y}\right)dy \qquad g \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}\right)dx$$

تفاضلة وسيطة للدالة f

تفاضكة الدال

differential of a functional

(functional (انظر: دالي)

تفاضلة جزئية لدالة في أكثر من متغير

differential of a function of several variables, partial

يسمى الحد $\frac{\partial f}{\partial x_r}dx_r$ لدالة $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ لدالة الجزئية للدالة $r=1,2,\ldots,n$ حيث $r=1,2,\ldots,n$

التفاضلة التامة لدالة في أكثر من متغير

differential of a function of several variables, total

التفاضئلة التامة للدالة $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ هي الصبيغة

 $df = \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + ... + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n$ $x_1, ..., x_n, dx_1, ..., dx_n \quad \text{illimited in the state of the$

تفاضلة مساحة مستوية = عنصر مساحة مستوية

differential of a plane area = element of a plane area

عنصر المساحة المستوية بدلالة الإحداثيات الديكارتية يساوى dxdy ، وبدلالة الإحداثيات القطبية يساوى $rdrd\theta$ ، ويلزم لتعيين المساحة في هذه الحالة استخدام التكامل الثنائي $\int \int dxdy$ أو التكامل الثنائي

مأخوذا بحيث يشمل المساحة المطلوب حسابها.

تفاضئلة طول القوس

differential of arc length

(arc length, differential of :انظر)

تفاضلة طول قوس منحنى مستو = عنصر طول قوس منحنى مستو differential of arc length of a plane curve = element of arc length of a plane curve

إذا كان طول قوس المنحنى بين نقطتين هو s فإن تفاضلته ds تعطى بأى من بالعلاقات:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} \, dy$$
 حيث يُعَبَّر عن $\frac{dy}{dx}$ بد لالة $\frac{dy}{dx}$ بد لالة الإحداثيات القطبية $\frac{dy}{dx}$ يعطى $\frac{dy}{dx}$ بالعلاقة
$$ds = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} \, d\theta$$

تفاضئلة طول قوس منحنى فراغي

differential of arc length of a space curve = element of arc length of a space curve

عنصر طول القوس للمنحنى الفراغي الذي معادلاته البار امترية
$$z=z\left(t\right)$$
 ، $y=y\left(t\right)$ ، $x=x\left(t\right)$

هو

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

تفاضلة الكتلة = عنصر الكتلة

differential of mass = element of mass

ho إذا كان dv هو عنصر القوس أو المساحة أو الحجم لجسم ما و ρ كثافته، فإن عنصر الكتلة يساوى ρdv .

تفاضئلة الحجم

differential of volume = element of volume

عنصر الحجم ويساوى في الفراغ الثلاثي dxdydz في الإحداثيات الديكارتية المتعامدة (x,y,z) و $\rho dzdpd\phi$ في الإحداثيات القطبية الأسطوانية (p,ϕ,z) و $r^2 \sin\theta drd\theta d\phi$ في الإحداثيات القطبية الكروية (r,θ,ϕ) .

مؤثر تفاضلي

differential operator

کثیر ة حدود في المؤثر D میث D حیث D یمثل . فمثلاً، D فمثلاً، $D^2 + xD + 5$ مؤثر تفاضلي، وبالتأثیر به علی $D^2 + xD + 5$ $(D^2 + xD + 5)y = \frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + 5y$

مؤثر تفاضلي عكسي

differential operator, inverse

رمز على الصورة

 $\frac{1}{f(D)}$

 $\frac{dy}{dx}-ay=g(x)$ مؤثر تفاضلي. فمثلاً، يمكن كتابة المعادلة f(D) مؤثر تفاضلي. على الصورة $\frac{1}{D-a}$ ، ويكون $\frac{1}{D-a}$ هو المؤثر التفاضلي العكسي للمؤثر D-a .

بارامتر تفاضلي لسطح

differential parameter of a surface

إذا كانت f(u,v) دالة في متغيرين u و v ، وكان f(u,v) معادلاته البار امترية

x = x(u,v) , y = y(u,v) , z = z(u,v)

فان الدالة

$$\Delta_1 f = \left(\frac{df}{ds}\right)^2 = \frac{E\left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^2 - 2F\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial s} + G\left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^2}{EG - F^2}$$

حيث $\frac{df}{ds}$ المعاملات الأساسية من الرتبة الأولى للسطح و المشتقة محسوبة في الاتجاه العمودي للمنحنى S على S ، تكون لا متغيرة تحت تأثير تحويل المتغيرات S و التعبير عنها بدلالة وسيطين جديدين

 $v = v(u_1, v_1)$ $u = u(u_1, v_1)$

ويسمى $\Delta_1 f$ البار امتر التفاضلي من الرتبة الأولى للدالة f بالنسبة للسطح δ . (انظر : المعاملات الأساسية من الرتبة الأولى لسطح

(surface, fundamental coefficients of the first order of a

مشتقة تامة

differential, total

(انظر: التفاضئلة التامة لدالة في أكثر من متغير

(differential of a function of several variables, total

التفاضل

differentiation

عملية إيجاد المشتقة (المعامل التفاضلي). (انظر: المشتقة (derivative)

صيغ التفاضل

differentiation formulae

الصيغ التي تعطى مشتقات الدوال أو تبسط عملية أيجاد مشتقات الدوال إلى عملية إيجاد مشتقات دوال أبسط.

تفاضل ضمني

differentiation, implicit

إيجاد مشتقة أحد متغيرين بالنسبة للآخر، وذلك بتفاضل كُل حدود المعادلة التي تربط بين المتغيرين وحل المتطابقة الناتجة. مثال ذلك، إذا كانت

$$x^2 + y^2 = 1$$

فإن

$$2x + 2yy' = 0$$

ومنها

$$y' = -\frac{x}{y}$$

تفاضل غير مباشر

differentiation, indirect

تفاضل دالة باستخدام الصيغة

$$\frac{d}{dx}f(u) = (\frac{d}{du}f(u))(\frac{du}{dx})$$

x دالة في u و u دالة في f(u)

تفاضل لوغاريتمي

differentiation, logarithmic

إيجاد مشتقة متغير بالنسبة لآخر بأخذ لوغاريتم طرفي معادلة تتضمنهما ثم إجراء التفاضل. وتستخدم هذه الطريقة لإيجاد مشتقة متغير مرفوع لأس يتضمن المتغير نفسه وكذلك لتبسيط بعض العمليات التفاضلية. مثال ذلك، إذا كانت

$$y=x^x$$
فإن $\log y=x\log x$ $\log x=x^x(1+\log x)$ أو $\frac{y'}{y}=1+\log x$

تفاضل متسلسلة لا نهائية

differentiation of an infinite series

المتسلسلة الناتجة عن تفاضل كل حد من حدود المتسلسلة الأصلية، وهى تمثل مشتقة الدالة الممثلة للمتسلسلة المعطاة في نفس الفترة إذا كانت المتسلسلة الناتجة منتظمة التقارب في هذه الفترة.

تفاضل تكامل

differentiation of an integral

derivative of an integral (انظر : مشبقة تكامل

تفاضل معادلات بارامترية

differentiation of parametric equations

بانسبة y=h(t) هي x=g(t) , y=h(t) بانسبة x=g(t) معادلات بار امترية، فإن مشتقة y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt}$$

 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ بشرط أن تكون مثال ذلك، إذا كان

$$x = \sin t , y = \cos^2 t$$

فإن

$$\frac{dx}{dt} = \cos t , \frac{dy}{dt} = -2\sin t \cos t$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt} = -2\sin t$$

تفاضل متعاقب

differentiation, successive

إيجاد المشتقات ذات الرتب الأعلى بتفاضل المشتقات ذات الرتب الأدنى.

رقم

digit

رمز يستخدم لتمثيل الأعداد الصحيحة غير السالبة التي تكون أصغر من أساس نظام عدد معين. مثال ذلك، كل من 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 رقم في نظام العد العشري. والعدد 23 يتضمن الرقمين 2 و 3 .

أرقام معنوية

digits, significant

الأرقام التي تحدد كسر لوغاريتم عدد ما، أي أرقام العدد التي تبدأ بــالرقم على أقصى اليسار والذي لا يساوى الصفر وتنتهي بالرقم الأخــير والــذي لا يساوى الصفر.

الأرقام ذات المغزى والتي يتضمنها عدد ما وهي الأرقام التي تبدأ بالرقم على أقصى اليسار من العلامة العشرية ولا يساوى الصفر، أو بالأرقام التي تبدأ من أول رقم على يمين العلامة العشرية وتنتهي عند الرقم الموجود في أقصى يمين العلامة العشرية وذلك في حالة عدم وجود رقم غير صفري على يسار العلامة العشرية، مثال ذلك: الأرقام المعنوية للعدد 0.230 هي 0.330 وللعدد 230 هي 2,3,0 ايضا حيث يعنى وجود الصفر أن الدقة هي لثلاثة أرقام عشرية. الصفر في العدد 0.23 هو رقم غير معنوي أما بالنسبة للعدد 0,002 فالصفر على يمين العلامة العشرية فيه معنوي.

زاوية ثنائية الوجه

dihedral angle

angle, dihedral : انظر)

تمدد

dilatation

التغير في وحدة الحجم لجسم من مادة قابلة للتشكل. فإذا رمز للانفعالات الأساسية بالرموز e_1, e_2, e_3 فإن التمدد الحجمى النسبى θ يعطى بالعلاقة

$$\theta = (1 + e_1)(1 + e_2)(1 + e_3) - 1$$

وللانفعالات الصىغيرة يكون

 $\theta = e_1 + e_2 + e_3$

تقريباً.

Y - تحويل المستوى أو الفراغ ينتج عنه تكبير أو تصغير الجميع أجزاء شكل فيه بنسبة ثابتة تسمى معامل التمدد (dilatation coefficient) . وإذا وُصلّت أي نقطتين من الشكل بصورتيهما بالتحويل بقطعتين مستقيمتين فإن هاتين القطعتين تلتقيان في نقطة تسمى مركز التمدد

· (centre of dilatation)

بُعد

dimension

لفظ يتعلق بمفاهيم الطول أو المساحة أو الحجم. فالشكل الهندسي الذي له طول فقط يقال له أحادى البُعد، وما له مساحة فقط يقال له ثنائي البُعد، وما له حجم يقال له ثلاثي البُعد.

بعد فراغ مقياسى

dimension of a metric space

يقال لفراغ مقياسي إنه نوني البُعد إذا وجد:

۱- لكل عدد صحيح موجب ε غطاء مغلق للفراغ رتبته أقل من أو تساوى (n+1).

 ε عدد صحیح موجب ε بحیث تکون رتبة کل غطاء ε مغلق للفراغ أکبر من ε . ε

شكل هندسي نوني البعد

dimensional geometric configuration, n-

يقال الشكل هندسي إنه نوني البُعد إذا كان أقل عدد من البار امترات الحقيقية القيمة التي يمكن استخدامها اتصاليا لتعيين نقط الشكل هو n.

عدد الأبعاد (البُعدية)

dimensionality

عدد أبعاد أي كمية.

تحليل ديوفانتيني

Diophantine analysis

طريقة لإيجاد حلول معادلات جبرية معينة كتكاملات، وتعتمد في الأساس على براعة استخدام البارامترات الاختيارية.

تنسب الطريقة إلى عالم الرياضيات الإغريقي السكندري "ديوفاننس" (حول عام 250 بعد الميلاد).

تُنائي القطب (المزدوج) الكهربائي

dipole, electric

نظام من شحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في الإشارة بينهما مسكفة. وعزم هذا المزدوج هو متجه مقداره حاصل ضرب قيمة الشحنة في المسافة واتجاهه من الشحنة السالبة إلى الموجبة. والمألوف التعامل مسع ما يسمى بالمزدوج الرياضي، وفيه تؤول قيمة الشحنة إلى ما لانهاية والمسافة إلى الصفر بحيث يظل العزم كمية محددة غير صفرية.

زاوية موجّهة

directed angle

زاوية يكون قياسها سالبا أو موجبا تبعا لاتجاه دوران ذراعها في اتجاه عقارب الساعة أو عكسه.

خط مستقيم موجه (أو قطعة مستقيمة موجَّهه)

directed line (or line segment)

خط مستقيم (أو قطعة مستقيمة) مبيَّن عليه الاتجاه ويُؤخذ هذا الاتجاه اتجاها موجباً وعكسه ساليا.

أعداد موجَّهة = أعداد إشارية = أعداد جبرية

directed numbers = signed numbers = algebraic numbers

(algebraic number عدد جبري)

فئة موجَّهة = منظومة موجَّهة = فئة "مور وسميث"

directed set = directed system = Moore-Smith set

مجموعة مرتبّة D ويعنى ذلك وجود علاقة تتحقق لبعض الأزواج المرتبّة a من a وتقرأ a تسبق a بحيث :

a > c فان b > c , a > b

 $a \in D$ لکل a > a -

 $c\in D$ فإنه يوجد $b\in D$ ، $a\in D$ بحيث $-\mathbb{T}$

c > b c > a

مشتقة اتجاهيه

directional derivative

المشتقة الاتجاهيه لدالة عند نقطة في اتجاه معين هي معدل تغير الدالة عند هذه النقطة في هذا الاتجاه.

(gradient of a function انظر: مَيْل دالة)

زوايا الاتجاه لخط مستقيم في الفراغ

direction angles for a straight line in space

(angles for a straight line in space, direction) انظر:

مركبات اتجاه العمود لسطح

direction components of the normal to a surface

(انظر: جيوب تمام اتجاه العمود لسطح

(direction cosines of the normal to a surface

جيوب تمام الاتجاه

direction cosines

(انظر: cosines in space, direction)

جيوب تمام الاتجاه لعمود لسطح

direction cosines of the normal to a surface

إذا أعطى سطح & بالصورة البارامترية

x = x (u,v), y = y (u,v), z = z (u,v)

فإن مركبات اتجاه العمود السطح عند نقطة منتظمة هي ثلاثة أعداد

$$\frac{A}{K}, \frac{B}{K}, \frac{C}{K}$$

حيث

$$K = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} , \quad A = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} , \quad B = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} , \quad C = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}$$

أعداد اتجاه خط مستقيم في الفراغ = مركبات اتجاه خط مستقيم في الفراغ = نسب اتجاه خط مستقيم في الفراغ

direction numbers of a line in space = direction components of a line in space = direction ratios of a line in space

(components of a line in space, direction)

اتجاه منحنى عند نقطة

direction of a curve at a point

اتجاه المماس للمنحني عند النقطة.

اتجاه خط مستقيم

direction of a straight line

١- اتجاه خط مستقيم في المستوى هو ميله، أي ظل الزاوية التي يصنعها مع
 الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٢- اتجاه خط مستقيم في الفراغ يتحدد بزوايا اتجاهه الثلاث.

الاتجاهات الأساسية للانفعال

directions of strain, principal

الاتجاهات الأساسية للانفعال عند نقطة من نقط وسط غير مشوه هي مجموعة الاتجاهات الثلاثة المتعامدة مَثنى مَثنى عند النقطة والتي تظل كذلك بُعد تشوه الوسط.

الاتجاهان المميّزان (الذاتيان) على سطح

directions on a surface, characteristic

(characteristic directions on a surface : انظر)

الاتجاهان الأساسيان لسطح

directions on a surface, principal

يوجد اتجاهان عند كل نقطة عادية للسطح يأخذ فيها نصف قطر الانحناء


العمودي قيمته العظمى المطلقة والصغرى المطلقة. وهذان الاتجاهان يكونان متعامدين (إلا إذا كان نصف قطر الانحناء العمودي هو نفسه لجميع الاتجاهات عند النقطة) ويسميان الاتجاهين الأساسيين للسطح عند هذه النقطة. (انظر: الانحناءان الأساسيان لسطح عند نقطة

curvatures of a surface at a point , principal (umbilical point on a surface

دائرة الدليل لقطع ناقص (أو لقطع زائد)

director circle of an ellipse (or hyperbola)

المحل الهندسي لنقطة تقاطع أزواج من المماسات المتعامدة للقطع الناقص (أو الزائد) ويوضح الشكل دائرة الدليل للقطع الثاقص .



مخروط الدليل لسطح مسطر

director cone of a ruled surface

مخروط مُكوَّن من مستقيمات تمر بنقطة ثابتة في الفراغ وتوازى الأزواج المتعامدة من مولدات السطح المسطر.

(انظر: مُبيّن الانحناء الكروي لسطح مسطر

(spherical indicatrix of a ruled surface

ضرب مباشر

direct product

اسم آخر لحاصل الضرب الديكارتي ويسمى أيضا حاصل الجمع المباشر (direct sum) .

(Cartesian product انظر: حاصل الضرب الديكارتي)

الدوال المثلثية المباشرة

direct trigonometric functions

الدوال المثلثية: الجيب وجيب التمام والظل وظل التمام والقاطع وقاطع التمام مميّزة عن الدوال المثلثية العكسية مثل دالة قوس الجيب.

دليل القطع المخروطي

directrix of a conic

(conic sections فطوع مخروطية)

دليل السطح الأسطواني

directrix of a cylindrical surface

(cylindrical surface انظر: سطح أسطواني)

دليل السطح المسطر

directrix of a ruled surface

منحنى يحتوى على نقطة من كل مولد للسطح المُسطَّر ولا يحتوى على أي نقاط غير واقعة على المولدات.

مستويان دليليان للسطح المكافئي الزائدي

directrix planes of a hyperbolic paraboloid المستويان المُكَونان من محور الصادات وكل من خطى تقاطع السطح المكافئي الزائدي

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

z = 0 .

خواص "دريشلت" المميّزة لدالة الجهد

Dirichlet characteristic properties of the potential function إذا كانت الدالة $\rho(x,y,z)$ ومشتقاتها الجزئية متصلة قِطعِيًّا وكانت فئة النقط التي لا تتلاشى عندها ρ يمكن احتواؤها في كرة نصف قطرها محدود، فإن خواص "دريشلت" لدالة الجهد:

$$U = \iiint_{\nu} \frac{\rho}{r} dV$$

حيث dV عنصر الحجم r البُعد بين نقطة المجال المأخوذ عندها عنصر الحجم ونقطة الدر اسة هي:

u-1 من فصل C^1 على الفراغ كله. u-1 من فصل C^2 على الفراغ كله ، فيما عدا سطوح عدم اتصال u-1 $\rho, \frac{\partial \rho}{\partial x}, \frac{\partial \rho}{\partial x}, \frac{\partial \rho}{\partial z}$ الدو ال

تحقق معادلة بو اسونu

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi\rho$$

وعند النقط التي تتلاشى عندها م تحقق الدالة 11 معادلة "لابلاس" $\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial z^2} = 0$

 $R \to \infty$ فعندما $R^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $M = \iiint \rho \, dv$ فعندما $-\xi$

يؤول $R(U-\frac{M}{R})$ إلى الصغر بينما يظل كل من

$$R^{3} \frac{\partial}{\partial x} (U - M/R), R^{3} \frac{\partial}{\partial y} (U - M/R), R^{3} \frac{\partial}{\partial z} (U - M/R))$$

تنسب الخواص إلى عالم الرياضيات الألماني "بيتر جوستاف دريشلت" · (P. G. L. Dirichlet, 1859)

(انظر : دالة الجهد لتوزيع حجمي من الشحنات أو من الكُتُل (potential function for a volume distribution of charge or mass

شروط در بشلت لتقارب متسلسلة "فوربيه"

Dirichlet conditions for the convergence of Fourier series متطلبات كون الدالة محدودة ولها عدد كبير ومحدود من نقط النهايات العظمى والصغرى وعدم الاتصال على الفترة المغلقة.

(Fourier theorem "فورييه ")

تكامل "در بشلت"

Dirichlet integral

تكامل دريشلت لدالة س في متغيرين x, y هو $\iint \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 dxdy$

حيث A المساحة المأخوذ عليها التكامل.

مبدأ "دريشلت"

Dirichlet principle

مبدأ ينص على أن الحل w(x,y) لمعادلة لابلاس الذي يحقق شروطا حدية معينة يعطى بالدالة من فئة الدوال المحققة لهذه الشروط و التي تجعل تكامل

$$\iint\limits_{A} \left[\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

أصغر ما يمكن. (انظر: تكامل "دريشلت" Dirichlet integral)

مسألة "دريشلت"

Dirichlet problem

(انظر: مسألة الشروط الحدية الأولى في نظرية الجهد (boundary value problem of potential theory, first

حاصل الضرب "لدريشلت"

Dirichlet product

u(x,y,z) , v(x,y,z) لدالتین D[u,v] عرف حاصل ضرب دریشلت الدالتین الدالتین الدیم ولمجال معطى R ولدالة غير سالبة معطاة $\rho(x, y, z)$ بالعلاقة: $D[u,v] = \iiint (\nabla u.\nabla v + \rho uv) dx dy dz$

حيث

$$\nabla u.\nabla v = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}$$
(Dirichlet integral "دریشلت")

متسلسلة "دريشلت"

Dirichlet series

متسلسلة لا نهائية من النوع

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^z}$$
 حيث يمكن أن تكون z و a_n أعداداً مركّبة. (Riemann zeta function)

صيغة "دريشلت"

Dirichlet's formula

الصيغة

$$\int_{a}^{b} dy \int_{a}^{y} w(x, y) dx = \int_{a}^{b} dx \int_{1}^{b} w(x, y) dy$$

لتبديل المتغير في تكامل ثنائي مجال تكامله المثلث المتساوي الساقين المحدود x=a , y=b , x=y بالمستقيمات

صيغة "دريشلت" التكاملية

Dirichlet's integral formula

١- الصيغة

$$\iint ... \int f(x_1 + x_2 + ... + x_n) x_1^{m_1^{-1}} x_2^{m_2^{-1}} ... x_n^{m_n^{-1}} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{\Gamma(m_1) \Gamma(m_2) ... \Gamma(m_n)}{\Gamma(m_1 + m_2 + ... + m_n)} \int_0^1 f(u) u^{m_1^{-1} + m_2^{-1} ... + m_n^{-1}} du$$

حيث $m_i < 0$ والتكامل بالجانب الأيسر للمعادلة يمتد على القيم غير السالبة للمتغيرات $x_1, x_2, ..., x_n$ المحققة للعلاقة $x_1, x_2, ..., x_n$ للمتغيرات $x_1, x_2, ..., x_n$ المحققة للعلاقة $x_1, x_2, ..., x_n$

$$\lim_{\omega \to \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \frac{\sin \omega (x-y)}{x-y} dy = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)]$$

حيث f(x+0) و f(x-0) بمثلان النهايتين من اليمين ومن اليسار على الترتيب للدالة f(x-0) .

اختبار دريشلت لتقارب متسلسلة

Dirichlet's test for convergence of a series

إذا كانت
$$\{a_n\}$$
 متتابعة ووجد عدد k بحيث

$$\left| \sum_{n=1}^{p} a_n \right| < k$$

لكل قيم p ، فإن المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ تكون تقاربية إذا كانت $u_n \geq u_{n+1}$

و کانت

 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ e uniting a with a simple of the limit of the limit

اختبار دريشلت للتقارب المنتظم لمتسلسلة

Dirichlet's test for uniform convergence of a series

k و $\left|\sum_{n=1}^{p}a_{n}(x)\right| < k$ بحيث k عدد لها عدد $a_{1},a_{2},...$ دو ال يوجد لها عدد $a_{1},a_{2},...$ بانتظام مستقلة عن p,x ، وكانت $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}(x)u_{n}(x)$ بانتظام عندما $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}(x)u_{n}(x)$ فإن المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}(x)u_{n}(x)$ نسبة الى عالم ويسمى هذا الاختبار أحيانا اختبار هاردي (Hardy's test) نسبة الى عالم الرياضيات الإنجليزي "جودفري هارولد هاردي" (G. H. Hardy, 1947) .

نظرية "دريشلت"

Dirichlet theorem

إذا كان r,a عددين أوليين كل بالنسبة للأخر فإن المتتابعة اللانهائية $\{a,a+r,a+2r,a+3r,...\}$

تحتوي على عدد لانهائي من الأعداد الأولية.

فئة غير مترابطة

disconnected set

فئة يمكن تجزئتها إلى فئتين U,V بحيث $V=U\cap V=0$ ولا تتمي أية نقطة تراكم إحدى الفئتين إلى الفئة الأخرى.

فئة غير مترابطة للغاية

disconnected set, extremely

يقال لفئة ما إنها غير مترابطة للغاية إذا كانت الفئة المغلِقة لكل فئة مفتوحة منها مفتوحة.

فئة غير مترابطة كلية

disconnected set, totally

يقال لفئة إنها غير مترابطة كلية إذا كانت كل فئاتها الجزئية التي تحتوى على أكثر من عنصر واحد غير مترابطة. مثال ذلك فئة الأعداد الكسرية (القياسية).

عدم الاتصنال

discontinuity

خاصية كون الدالة غير متصلة.

عدم اتصال محدود

discontinuity, finite

عدم اتصال توجد فيه فترة حول نقطة عدم الاتصال تكون فيها الدالة محدودة. مثال ذلك ، الدالة

$$y = \sin\frac{1}{x}$$

 $y = \sin \frac{1}{x}$ عدم اتصالها عند x = 0 محدود.

عدم اتصال غير محدود

discontinuity, infinite

عدم اتصال دالة تأخذ فيه قيمتها المطلقة قيما كبيرة بأية درجة وذلك باختيار قيم للمتغير قريبة بدرجة كافية من نقطة عدم الاتصال. مثال ذلك ، الدالة

$$y = \frac{1}{r}$$

عدم اتصالها عند x=0 غير محدود.

عدم اتصال عادى = عدم اتصال وثبي

discontinuity, ordinary = jump discontinuity

عدم اتصال تكون فيه نهايتا الدالة من اليمين واليسار موجودتين وغير متساويتين، مثال ذلك نهايتا الدالة

$$y = \frac{1}{1+2^{1/x}}$$

من اليمين ومن البسار هما الصفر والواحد على الترتيب، ويسمى الفرق بين النهايتين من اليمين ومن اليسار وثبة الدالة.

نقطة عدم اتصال

discontinuity, point of

نقطة تكون الدالة عندها معرفة وغير متصلة، أو نقطة تكون الدالة عندها غير x=0 معرفة. مثال ذلك الدالة $\frac{1}{r}=y=\frac{1}{r}$ فلها نقطة عدم اتصال عند

عدم اتصال قابل للإزالة

discontinuity, removable

إذا أمكن جعل الدالة غير المتصلة عند نقطة دالة متصلة عند هذه النقطة بإعطائها قيمة جديدة عند النقطة فإنه يقال إن عدم اتصالها قابل للإزالة ويكون ذلك ممكنا إذا تساوت نهايتا الدالة من اليمين ومن اليسار، مثال ذلك: الدالة

 $y = x \sin \frac{1}{x}$ x = 0 عند قابل للإزالة عند فاها عدم اتصال قابل للإزالة

دالة غير متصلة

discontinuous function

دالة لا تكون متصلة عند نقطة أو أكثر.

فئة منفرطة

discrete set

فئة من أعداد أو نقط ليست لها نقطة تراكم.

متغير منفرط

discrete variable متغير ثكون قيمه فئة غير مترابطة (منفرطة) ، مثال ذلك الأعداد الصحيحة.

دالة مُميِّزة

discriminant function (in Statistics)

ارتباط خطى لمجموعة من n من المتغيرات التي تُصنِف (في فصلين مختلفين) الأحداث أو المفردات التي يتاح قياس المتغيرات لها باقل نسبة ممكنة من السوء.

مميّز البارامتر (المميّز c) لمعادلة تفاضلية

discriminant of a differential equation, c-

u(x,y,c)=0 هـو F(x,y,y')=0 إذا كان الحل العام للمعادلة التفاضلية c البار امتر لهذه المعادلة هو ناتج حذف c بين المعادلتين:

$$u(x,y,c) = 0$$
 , $\frac{\partial u(x,y,c)}{\partial c} = 0$

مميّز المشتقة (المميّز p) لمعادلة تفاضلية

discriminant of a differential equation, p- يحصل على مميِّز المشتقة لمعادلة تفاضلية من النوع F(x,y,p)=0 حيث $p=\frac{dy}{dx}$ ، بحذف p

$$F(x,y,p) = 0$$
 , $\frac{\partial F(x,y,p)}{\partial p} = 0$

مميز معادلة كثيرة حدود

discriminant of a polynomial equation

مميّز المعادلة

$$x^{n} + a_{1}x^{n-1} + ... + a_{n} = 0$$

هو حاصل ضرب مربعات كل الفروق بين كل جذرين من جذور المعادلة.

مميّز المعادلة من الدرجة الثانية (التربيعية)

discriminant of a quadratic equation

مميّز المعادلة

$$ax^2 + bx + c = 0$$

 b^2-4ac إذا كان كل من a,b,c حقيقيا، فإن مميّز المعادلة يكون سالبا أو موجبا أو صفرا حسبما يكون الجذران تخيليين أو حقيقيين مختلفين أو متساويين.

مميّز معادلة من الدرجة الثانية في متغيرين

discriminant of a quadratic equation in two variables

مميّز المعادلة

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

هو

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2a & b & d \\ b & 2c & e \\ d & e & 2f \end{vmatrix} = 4acf - b^2 f - ae^2 - cd^2 + bde$$

إذا كان $0 \neq \Delta$ ، فإن المحل الهندسي لهذه المعادلة يكون قِطعا ناقصا (حقيقيا $b^2 - 4ac > 0$ وقطعا زائدا إذا كان $b^2 - 4ac < 0$ وقطعا زائدا إذا كان وقِطعا مكافئا إذا كان $\Delta=0$ ، أما إذا كان $\Delta=0$ ، فإن المحل الهندسي يكون نقطة ناقصية إذا كان $b^2 - 4ac < 0$ وخطين مستقيمين متقاطعین اذا کان $b^2 - 4ac > 0$ و خطین مستقیمین متو از بین أو منطبقین اذا $b^2 - 4ac = 0$ کان

مميز صيغة تربيعية

discriminant of a quadratic form

مميّز الصيغة التربيعية

$$Q = \sum_{i,j}^n a_{ij} x_i x_j$$
 . $\left| a_{ij} \right|$ هو المحدّد $a_{ij} = a_{ji}$ حيث $a_{ij} = a_{ji}$

مميِّز معادلة حقيقية من الدرجة الثالثة (تكعيبية)

discriminant of a real cubic equation

مميّز المعادلة

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

هو

 $a^2b^2 + 8abc - 4b^3 - 4a^3c - 27c^3$ ويكون هذا المميِّز موجبا إذا كان للمعادلة ثلاثة جذور حقيقية ومختلفة، وسالبا إذا كان للمعادلة جذر حقيقي واحد وجذران تخيليان وصفرا إذا كانت الجذور الثلاثة حقيقية واثنان منهما على الأقل متساويان.

فئتان منفصلتان

disjoint sets

فئتان لا يوجد عنصر مشترك بينهما.

فئات منفصلة متثنى متثنى

disjoint sets, pairwise

يقال لمجموعة من أكثر من فئتين أنها منفصلة مَثنى مَثنى إذا كأنَ كل اثنتين ّ من فئاتها منفصلين.

فصل عبارتين

disjunction of propositions

تكوين عبارة من عبارتين بسيطتين باستخدام أداة الربط "أو "وتكون العبارة المركبة من عملية الربط هذه صائبة إذا كانت إحدى العبارتين المكونتين لها أو كلتاهما صائبة، وتكون العبارة الناتجة خاطئة. إذا كان كل من مكوناتها خاطئة، مثال ذلك، فصل العبارتين " $7 = 8 \times 2$ "، "الزمالك بالقاهرة "هي " $7 = 8 \times 2$ أو الزمالك بالقاهرة "وهي صائبة وفصل العبارتين "اليوم الثلاثاء"، "اليوم مولد النبي "هي العبارة " اليوم الثلاثاء أو اليوم مولد النبي " التي تكون صائبة إلا

إذا لم يكن اليومُ الثلاثاء ولم يكن اليومُ يومَ مولد النبي. وفصل العبارتين p,q يكتب عادة على الصورة

 $p \vee q$

ويقرأ "p" أو "p".

تشتت (في الإحصاء)

dispersion (in Statistics)

انتشار البيانات الإحصائية وعدم تركزها في نقطة واحدة.

قياس التشتت (في الإحصاء)

dispersion, measure of (in Statistics)

يقاس النشتت بمقاييس متعددة منها التَغير والانحراف المعياري والأنحراف الربعي. الربعي.

إزاحة

displacement

كمية متجهة تدل على تغير موقع نقطة ما. فإذا انتقلت نقطة مادية من الموقع \overline{AB} . \overline{AB} .

إزاحة زاويّة

displacement, angular

إزاحة تنتج عن دوران جسم حول محور وتقاس بالزاوية الَّتي يدورها الجسم حول المحور.

إزاحة خطية

displacement, linear

إزاحة لجسم تمثل فيها إزاحة كل نقطة من نقطه بنفس المتجه.

عرض

display

عرض المعلومات التي تكون عادة من الحروف أو الأرقام أو الأشكال الهندسية.

حدود غير متشابهة

dissimilar terms

الحدود التي ليس لها نفس الدرجة أو التي لا تحتوى على نفس المتغير. مثال ذلك ، 3x, 5y, 27 حدان غير متشابهين 3x, $5x^2$ هي أيضا حدود غير متشابهة.

البعد بين مستقيمين متوازيين

distance between two parallel lines طول القطعة المستقيمة التي يقطعانها من عمود مشترك لهما.

البعد بين مستويين متوازيين

distance between two parallel planes طول القطعة المستقيمة التي يقطعانها من عمود مشترك لهما.

البعد بين نقطتين

distance between two points طول القطعة المستقيمة التي تصل النقطتين. وفي الهندسة التحليلية، إذا كانت النقطتان هما $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2)$ بالنسبة إلى ثلاثة محاور متعامدة فإن البُعد بينهما يساوى

$$\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$$

البعد الزاوى بين نقطتين

distance between two points, angular
(angular distance between two points) انظر:

البعد بين مستقيمين متخالفين

distance between two skew lines طول القطعة المستقيمة التي تصل بين المستقيمين والعمودية على كل منهما.

البعد بين نقطة وخط مستقيم

distance from a point to a line البُعد العمودي من النقطة إلى الخط المستقيم. وإذا كانت (x_1, y_1) هي النقطة وكانت معادلة المستقيم

ax+by+c=0

في المستوي الذي يجمع النقطة والمستقيم، فإن البُعد بين النقطة والخط المستقيم يساوى

 $\frac{\left|ax_1 + by_1 + c\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

البعد بين نقطة ومستوى

distance from a point to a plane

طول العمود من النقطة للمستوى. إذا كانت (x_1,y_1,z_1) هي النقطة، وكانت معادلة المستوى ax+by+cz+d=0 معادلة المستوى يساوى $\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

دالة "مينكوفسكى" للبُعد

distance function, Minkowski

(Minkowski distance function) انظر:

البعد القطبي لنقطة سماوية

distance of a celestial point, polar

(انظر: الميل الزاوي المرافق لنقطة سماوية محدود الميل الزاوي المرافق المقطة الماوية (point

البعد السمَّتي

distance of a star, zenith

البُعد الزَّاوي من السمت للنجم مقيسا على امتداد الدائرة العظمى المارة بالسمت والنظير والنجم، وهي متممة زاوية الارتفاع.

معادلة المسافة والسرعة والزمن

distance-rate-time formula

المعادلة التي تنص على أن المسافة d المقطوعة بجسم يتحرك بسرعة قيمتها ثابتة v في زمن معين t هي حاصل ضرب السرعة والزمن، أي أن d=v

توزيع (في الإحصاء)

distribution (in Statistics)

الترتيب النسبي لفئة من الأعداد، وهي فئة القيم لمتغير والتكرارات لكل قيمة. وأحيانا يستخدم الاصطلاح "توزيع تكراري" (frequency distribution) للتمييز عن الترتيب طبقا لمعيار آخر مثل الزمن أو الموقع.

توزيع ذي الحدين (التوزيع الحداني)

distribution, binomial

(binomial distribution) انظر:

توزيع F

distribution, F

توزیع العینات المأخوذة عشوائیا للنسبة بین تقییمین مستقلین (x_1,x_2) لتباین توزیع طبیعی:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{n_2 x_1^2}{n_1 x_2^2}$$

حيث n_1 و n_2 عددا درجات الحرية في التقديرين الأول والثاني المستقلين على الترتيب.

التوزيع التكراري

distribution, frequency

(frequency انظر: النكرار)

دالة التوزيع (في الإحصاء)

distribution function (in Statistics)

دالة تعطى منحنى التكرار التراكمي المناظر للقيم المختلفة ورياضيا

$$F(x_k) = \sum_{i=1}^k f(x_i)$$

 x_1 الذي له n من القيم من x_1 الذي له x_2 المتصل في دالة التوزيع التي تعطى التكرار المتراكم من x_2 المي x_3 المين المي

$$F(b) = \int_{a}^{b} f(x) dx$$

حيث f(x) دالة التكرار. الدالة F(x) تسمى دالة التوزيع الاحتمالي

f(x) والدالة (probability distribution function) والدالة (f(x) تسمى دالة الكثافة الاحتمالية (probability density function)

دالة التوزيع النسبية

distribution function, relative

(probability density function

(انظر: دالة كثافة الاحتمال

توزيع "جبرات"

distribution, Gibrat

إذا كان لوغاريتم المتغير x موزعاً طبيعيا، فإن x توزع طبقاً لتوزيع "جبرات" بالعلاقة

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{1}{2}(\log x)^2}$$

التوزيع الطبيعي (في الإحصاء)

distribution, normal (in Statistics)

توزيع يتبع المنحنى التكراري الطبيعي.ُ

توزيع "بواسون"

distribution, Poisson

توزيع تكون دالة تكراره على الصورة

$$f(x) = \frac{m^x e^{-m}}{x}$$

عندما x=0,1,2,... محیث x=0,1,2,...

(mean or variance) حيث الوسط والتباين لتوزيع "بواسسون" متساويان. ويظهر هذا التوزيع عادة عند ملاحظة الأحداث التي لا يحتمل وقوعها بدرجة كبيرة والتي تحدث أحيانا لوجود الكثير من المحاولات، مثال ذلك: وفيات المرور ، الحوادث، الانبعاث الإشعاعي. ويؤول التوزيع الحداني إلى توزيسع بواسون عندما m=np .

ينسب التوزيع إلى عالم الإحصاء الفرنسي "سيميون دنيس بواسون" (S.D. Poisson, 1840)

توزيع متخالف (في الإحصاء)

distribution, skew (in Statistics) توزيع غير متماثل، التوزيع يكون مائلاً لليسار (أو لليمين) إذا كان ذيله الطويل

على اليسار (أو على اليمين)، ورياضيا، يكون التوزيع مائلاً لليسار (أو اليمين) إذا كان العزم الثالث حول الوسط سالبا (أو موجباً).

توزيع متماثل (في الإحصاء)

distribution, symmetrical (in Statistics)

توزيع متماثل بالنسبة للوسيط (median)، أي توزيع أحد جانبية انعكاس للجانب الآخر بالنسبة للوسيط.

توزيعات "بيرسون"

distributions, Pearson

توزیعات "بیرسون" هي فئة دو ال التكر ار المعرفة بالمتساویة $\frac{df(x)}{dx} = \frac{(x-a)f(x)}{b_o + b_1 x + b_2 x^2}$

حيث a,b_o,b_1,b_2 دوال في عزم التوزيع. تنسب التوزيعات إلى عالم الإحصاء الانجليزي "كارل بيرسون" (K. Pearson, 1936)

توزيع مأقتضب

distribution, truncated

توزيع مقطوع حيث لا توجد فيه قيم للمتغير x أكبر من a (أو أصغر من a). ويقال عندئذ إن التوزيع مُقتضب عند القيمة a

توزيعي

distributive

يقال لعملية إنها توزيعية بالنسبة لقاعدة الترابط إذا كان إجراء العملية على مجموعة عناصر من فئة من المقادير مكافئا الإجراء العملية على كل عنصر من عناصر الفئة مع ربط النتائج بقاعدة الترابط نفسها مثال ذلك:

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

حيث قاعدة الترابط هنا هي جمع والدالة sin x ليست توزيعية، لأن

 $\sin(x+y) \neq \sin x + \sin y$

قانون التوزيع للحساب والجبر = قانون توزيع عملية الضرب على الجمع distributive law of arithmetic and algebra = distributive law of multiplication and addition

القانون الذي ينص على أن:

a(b+c)=ab+ac

لجميع الإعداد a, b, c مثال ذلك، \hat{a} \hat{a}

$$(x+y)(2x+3) = x(2x+3) + y(2x+3) = 2x^2 + 3x + 2xy + 3y$$

تباعد ممتد

divergence of a tensor function

(tensor) مُمتد

تباعد دالة متجهة

divergence of a vector function

تباعُد دالة متجهة مركباتها في اتجاهات محاور الإحداثيات الديكارتية المتعامدة هي (X,Y,Z) هو الدالة القياسية

$$\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$$

ويأخذ صورا أخرى مكافئة باختلاف نظم الإحداثيات.

نظرية التباعد

divergence theorem

(Green's theorem in space انظر: نظرية جرين في الفراغ)

متتابعة تباعدية

divergent sequence

متتابعة ليست تقاربية.

متسلسلة تباغية

divergent series

متسلسلة ليست تقاربية.

متسلسلة تباعدية تذبذبية - متسلسلة تذبذبية

divergent series, oscillating = oscillating series

متسلسلة تباعدية ولكنها ليست تبآعدية تماما أي لا تؤول إلى ص+ أو إلى ∞ - مثال ذلك، كل من المتسلسلتين:

1-2+3-4+... (1-1+1-1+...

تباعُدية تذبذبية.

متسلسلة تباغبية تماما

divergent series, properly

متسلسلة تؤول منتابعة مجاميعها الجزئية إلى ٥٠ أو إلى ٥٠ . مثال

جمع متسلسلة تباغية

divergent series, summation of

أسلوب لأخذ مجاميع مميّزة للمتسلسلة التباعدية يجعل هذه المجاميع متقاربة، فمثلا المجموع ...+1-1+1-1 يمكن تعريفه بأنه المجموع مع وضعه x=-1 مع وضع x=-1 مع وضعه المجموع ، أو وضعه

على الصورة

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 + 0 + 1 + \dots + \frac{1}{2} \left[1 - (-1)^2\right]}{n}$$

حيث S_n ترمز لمجموع n حدا الأولى من المتسلسلة. وفي كلتا الحالتين يكون المجموع $\frac{1}{2}$. والطريقة الأولى توضيح استخدام معاملات التقارب، وهي في هذه الحالة ١,x,x²,٠٠٠ أما الطريقة الأخرى ، فتوضيح طريقة المتوسطات الحسابية.

(انظر: طريقة "آبل" لجمع المتسلسلات

Abel's method of summation of series وصيغة "تشيزارو" للجمع Cesaro's summation formula وتعريف "هولدر" لمجموع متسلسلات للأlder's definition of the sum of a divergent series

يَقسم

divide

يُجرى عملية قِسمة. (انظر: قِسمة division)

المقسوم

dividend

كمية تقسم على كمية أخرى. (انظر: قِسمة division)

قابلية القسمة

divisibility

معيار يستخدم الختبار قبول عدد صحيح ما القسمة على عدد صحيح آخر دون باق.

قسمة

division

-1 إحدى العمليات الأساسية في علم الحساب. إذا كان a,b عددين موجبين، a>b تعنى a/b ، فعملية قسمة a>b التي يحتويها a ويسمى هذا العدد أكبر عدد من مضاعفات a التي يحتويها a ويسمى هذا العدد خارج القسمة، كما يسمى المتبقي (ويكون أصغر من a) بباقي القسمة. ويقال أن a تقبل القسمة على a إذا كان الباقي صفراً.

Y- في الجبر (وهو الحالة العامة) عملية القسمة هي معكوس عملية الضرب. الجبر a, $b \neq 0$ $b \neq 0$ كميتين جبريتين، a, $b \neq 0$ وكان: a كميتين جبريتين، a على a ويسمى a المقسوم a القاسم أو المقسوم عليه. ويقال أيضا إن ناتج قسمة a على a هو حاصل ضرب a في المعكوس الضربي للكمية a.

القِسمة على كسر عشري

division by a decimal

ضرب المقسوم والقاسم بالعدد 10 مرفوعا للقوة التي تجعل القاسم عددا صحيحا ثم إجراء القسمة كما في الأعداد الصحيحة مع وضع العلامة العشوية في المكان الصحيح في ناتج القسمة. مثال ذلك:

28,7405:23,5=287,405:235

القسمة باستخدام اللوغاريتمات

division by use of logarithms

إجراء عملية القِسمة باستخدام حقيقة أن لوغاريتم قسمة عددين يساوى لوغاريتم المقسوم مطروحا منه لوغاريتم القاسم.

القسمة بمقياس p

division modulo p

q(x) على كثيرة حدود f(x) على كثيرة حدود أخرى الأعبارة:

 $f(x)=q(x).d(x)+r(x) \pmod{p}$

حيث d(x), p(x) كثيرتا حَدُود أيضًا، وكَانَتُ جُميْع معاملات كثيرات الحدود هذه أعدادا صحيحة من بين الأعداد p عدد صحيح فإنه يقال أن القِسمة بمقياس p .

قِسمة كسر على عدد صحيح

division of a fraction by an integer

قِسمة بسط الكسر على العدد الصحيح ثم قِسمة الناتج على مقام الكسر أو قسمة ابسط الكسر على حاصل ضرب المقام في العدد الصحيح. مثال ذلك

$$\left(\frac{4}{2}\right)$$
:5 = 4:(5x2) = $\frac{2}{5}$

قسمة توافقية لقطعة مستقيمة

division of a line segment, harmonic

قِسمة القطعة المستقيمة خارجيا وداخليا بنفس النسبة.

قسمة أعداد كسرية

division of mixed numbers

عملية اختزال الأعداد الكسرية إلى كسور اعتيادية ثم إجراء عملية القسمة.

مثال ذلك:

$$1\frac{2}{3}:3\frac{1}{2} = \frac{5}{3}:\frac{7}{2} = \frac{10}{21}$$

نقطة التقسيم

division, point of

هي النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتين معينتين بنسبة ما. إذا كانت الإحداثيات الديكارتية للنقطتين A, B في المستوى هي A ما التي تقسيم AB بحيث AB بحيث AB مما $AP:BP=\frac{m_1}{m}$

$$x = \frac{m_2 x_1 + m_1 x_2}{m_1 + m_2}$$
 , $y = \frac{m_2 y_1 + m_1 y_2}{m_1 + m_2}$

وتقع نقطة التقسيم P في القطعة المستقيمة (أي بين A,B) أو على امتدادها على حسب كون $\frac{m_1}{m_2}$ موجبا أو سالبا. ويقال أن التقسيم داخلي في الحالة الأولى وخارجي في الحالة الثانية.

نسبة التقسيم

division ratio = ratio of division

(division, point of انظر: نقطة التقسيم)

قسمة تأليفية

division, synthetic

أما في القسمة التأليفية، فتكتب هذه الخطوات كالتالي:

المعاملات المنفصلة (detached coefficients) ، 1-,2 في خارج القسمة تسمى البواقي الجزئية، بينما يسمى الحد الأخير، وهو هنا الصفر، الباقى.

تحويل القسمة

division transformation

العلاقة: المقسوم = (خارج القِسمة × القاسم) + الباقى

قاسم

divisor

(division)

قاسم مشترك

divisor, common

(common divisor : انظر)

القاسم المشترك الأعظم

divisor, greatest common

(انظر: common divisor, greatest)

قاسم طبيعي لزُمرة = زُمرة جزئية غير متغيرة من زمرة = زمرة جزئية طبيعية

divisor of a group, normal = invariant subgroup of a group = normal subgroup

زمرة جزئية H من زمرة G بحيث يكون التحويل لأي عنصر من عناصر H عنصر أفي H .

مضلع اثنا عشري

dodecagon

(polygon انظر: مضلع

مضلع اثنا عشري منتظم

dodecagon, regular

(polygon انظر: مضلع)

متعدد أوجه اثنا عشري

dodecahedron

(polyhedron فجه) (انظر: متعدد أوجه

متعدد أوجه اثنا عشري منتظم

dodecahedron, regular

(انظر: متعدد أوجه polyhedron)

نطاق

domain

فئة مفتوحة ومترابطة وغير خالية. ويستخدم المصطلح أيضا لأي فئة مفتوحة غير خالية وتسمى عندئذ منطقة (region) .

نطاق صحيح (في الجبر)

domain, integral (in Algebra)

حلقة إبدالية ذات عنصر وحدة وليس لها قواسُم أصلَّية للصَّفر. أ

مثال ذلك فئة الأعداد الصحيحة العادية (الموجبة والسالبة والصفر، وفئة جميع الأعداد الصحيحة الجبرية).

(algebraic integer (انظر: عدد صحيح جبري)

مجال الدالة

domain of a function

فئة القيم التي يأخذها المتغير المستقل وتقابلها فئة قيم المتغير التابع التي تسمى المجال المصاحب (co-domain)

مجال الاعتماد لمعادلة تفاضلية جزئية

domain of dependence for a partial differential equation (dependence, domain of انظر: مجال الاعتماد)

الاستراتيجية المهيمنة

dominant strategy

(strategy استراتيجية)

متجه مهيمن

dominant vector

 $m{b} = (b_1, b_2, ... b_n)$ ، $m{a} = (a_1, a_2, ..., a_n)$ نيقال أن المتجه من بين المتجهين أدا تحققت المتباينة $a_i \geq b_i$ لكل عديث $a_i \geq b_i$ مطلق الميمنة بالنسبة للمتجه $a_i \geq a_i$ وكذلك يقال أن المتجه $a_i \geq a_i$ مطلق الهيمنة بالنسبة للمتجه $a_i \geq a_i$ لكل $a_i > b_i$ المتباينة المطلقة $a_i > b_i$ مطلق المتباينة المطلقة المطلقة المطلقة المحالية المطلقة المحالية المطلقة المطلقة المحالية المطلقة المحالية المطلقة المحالية المطلقة المحالية الم

حاصل الضرب الثقطي لمتجهين= حاصل الضرب القياسي لمتجهين = حاصل الضرب الداخلي لمتجهين

dot product of two vectors = scalar product of two vectors = inner product of two vectors

العدد القياسي المساوي لحاصل ضرب طولي المتجهين وجيب تمام الزاوية بين التجاهيهما. وتتحدد الزاوية برسم المتجهين خارجين من نقطه واحدة.

صيغ (متطابقات) ضعف الزاوية في حساب المثلثات

double-angle formulae (identities) of trigonometry

صيغ تعبر عن الجيب، جيب التمام ، الظل، ... لضبعف الزاوية بدلالة دوال الزاوية وأهمها:

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$$

القانون المزدوج للقيمة المتوسطة

double law of the mean value

(انظر: نظرية "كوشي" للقيمة المتوسطة "Cauchy's mean value theorem")

نقطة مزدوجة

double point

١- نقطة يقطع المنحنى نفسه عندها.

٢- نقطة على منحنى له عندها مماسان ، وهذان المماسان قد يكونان
 حقيقيين (مختلفين أو متطابقين) أو تخيليين.

جذر مزدوج لمعادلة جبرية = جذر ثنائي التعددية

double root of an algebraic equation = root of multiplicity two جذر لمعادلة جبرية يتكرر مرة واحدة فقط، أي يظهر مرتين فقط في المعادلة.

مماس مزدوج

double tangent

١- خط مستقيم يمس المنحنى عند نقطتين مختلفتين عليه.
 ٢-مماسان لمنحنى منطبقان مثل المماسيين عند ناب لمنحنى.

مزدوج = تنائي القطب

doublet = dipole

(dipole, electric انظر : ثنائي القطب الكهربائي)

مُعاوقة

drag

المقاومة التي يلقاها جسم متحرك في مائع.

مُعاوِقة محورية

drag, axial

المقاومة التي يلقاها جسم يتحرك حركة محورية في مائع وتكون في عكسُ اتجاه محور التقدم.

الرسم بمقياس

drawing to scale

عمل نسخة لرسم ما تكون الأبعاد فيها متناسبة مع الأبعاد المناظرة في الأصل.

عنصران متبادلان في الهندسة الإسقاطية

dual elements in plane projective geometry

العنصران المتبادلان في الهندسة الإسقاطية همَّا النَّقطة والَّخط المستقيم.

شكلان متبادلان في الهندسة الإسقاطية المستوية

dual figures in plane projective geometry

شكلان هندسيان يمكن الحصول على أحدهما من الآخر باستبدال كل عنصر بالعنصر المتبادل معه وكل عملية بالعملية الثنائية معها. مثال ذلك، ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة في نقطة وثلاث نقط على خط مستقيم واحد.

صيغتان متبادلتان

dual formulas

صيغتان العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين نظريتين متبادلتين. (انظر: نظريتان متبادلتان dual theorems)

عمليتان متبادلتان في الهندسة الإسقاطية المستوية

dual operations in plane projective geometry

عمليتان متبادلتان بين النقطّة والخط المستقيم. مثال ذلك عمليتا رسم خطَّ مستقيمين مستقيمين مستقيمين يمر ان بنقطة وتعيين نقطة على خط مستقيم وكذلك عمليتا رسم مستقيمين يمر ان بنقطة وتعيين نقطتين على خط مستقيم.

نظريتان متبادلتان

dual theorems

(انظر: مبدأ الثنائية في الهندسة الإسقاطية

duality of projective geometry, principle of مبدأ الثنائية للمثلث ثام duality in a spherical triangle, principle of

نظريتان متبادلتان في الهندسة الإسقاطية المستوية

dual theorems in plane projective geometry

نظريتان يمكن الحصول على إحداهماً من الأخرى باستبدأل العناصر والعمليات بنظائرها الثنائية.

مبدأ الثنائية للمثلث الكروى

duality in a spherical triangle, principle of

مبدأ ينص على أنه يمكن الحصول من أي صيغة تتضمن أضلاع المثلث المثلث الكروي ومكملات الزوايا المقابلة لهذه الأضلاع على صيغة أخرى صحيحة باستبدال كل ضلع بمكملة الزاوية المقابلة له وتسمى الصيغة الجديدة الصيغة المثناه.

مبدأ الثنائية في الهندسة الإسقاطية

duality in projective geometry, principle

مبدأ ينص على أنه إذا كانت إحدى نظريتين متنى تين صحيحة، فإن الأخرى تكون صحيحة أيضا.

نظرية الثنائية لـ "بوانكاريه"

duality theorem, Poincaré

نظرية تنص على أن أعداد بيتي الميمية البُعد B_G^m لكثير طيات موجه متشابه الشكل مع مجموعة نقط مركب تبسيط نونية البُعد تحقق

 $B_G^m = B_G^{n-p}$

حيث G الزمرة المعرف لها سلاسل وزمرات هومولوجية (homology) وقد أثبت "بوانكاريه" هذه النظرية في الحالة التي يكون في هو زمرة G زمرة الأعداد الكسرية ، وقد أعطى " فيلن " الإثبات في حالة كون G زمرة المعداد الصحيحة بمقياس G ، وقد أعطى " الكسندر " الإثبات في حالة كون G زمرة الأعداد الصحيحة مقياس G حيث G عدد أولى. تنسب النظرية إلى عالم الرياضيات الفرنسي "جول هنري بوانكاريه" (J. H. Poincaré, 1912).

مبارزة

duel

في نظرية المباريات هي مباراة ذات مجموع صفري بين شخصين وتتضمن توقيت القرار. وبطء اتخاذ القرار يزيد الدقة ولكنه يزيد أيضا احتمال قيام الخصم بالتنفيذ أولا.

مبارزة مكشوفة

duel, noisy

مبارزة يعرف كل لاعب فيها عند كل لحظة ما إذا كان خصمه قد أخذ موقفا ما.

مبارزة غير مكشوفة

duel, silent

مبارزة لا يَعْرف فيها اللاعب على الإطلاق ما إذا كان خصمه قد قرر موقفاً.

نظرية "دوهاميل"

Duhamel's theorem

نظریة فی النهایات تنص علی أنه إذا كان

$$\lim_{n\to\infty}\sum \alpha_i(n)=l$$

حيث $\alpha_i(n)$ كميات متناهية في الصغر، فإن

$$\lim_{n\to\infty}\sum \left[\alpha_i(n)+\beta_i(n)\right]=l$$

arepsilon>0 حيث $eta_i(n)$ كميات أخرى متناهية في الصغر وبشرط أن يوجد لكل $eta_i(n)$ حدد n>N لكل $\left|rac{eta_i(n)}{lpha_i(n)}
ight|<arepsilon$ نكل N>N

مُبين انحناء "ديوبن" لسطح عند نقطة

Dupin indicatrix of surface at a point

إذا أخذ المماسان لخطوط الانحناء عن النقطة P للسطح S كمحورين للإحداثيات ξ, η وكان ρ_1, ρ_2 نصفي قطري الانحناء الرئيسيين المناظرين للسطح S عند S فإن مبين انحناء "ديوبن" للسطح S عند S عند S يكون

$$\xi^2 = |\rho|$$
 $\xi^2 = \frac{\xi^2}{\rho_1} + \frac{\eta^2}{\rho_2} = \pm 1$
 $\xi^2 = \frac{\xi^2}{|\rho_1|} + \frac{\eta^2}{|\rho_2|} = 1$

حسبما كان الانحناء الكلى للسطح S عند P موجبا أو سالبا أو صفرا على الترتيب.

مضاعفة المكعب

duplication of the cube

إيجاد طول حرف مكعب حجمه يساوى ضعف حجم مكعب معين باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط، وهي مسالة حل المعادلة $y^3 = 2a^3$ لإيجاد y ، وهذا مستحيل لأن الجذر التكعيبي للعدد 2 لا يمكن حسابه باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار فقط.

دياد

dyad

مجاورة متجهين بدون الإشارة إلى الضرب القياسي أو الاتجاهي ويعبر عنها ً C على الصورة Q = AB ويمكن النظر للدياد على أنه يؤثر على متجه بالقاعدة

QC=(B.C)Aويسمى المتجه الأول المقدم ويسمى المتجه الأالي التالي.

دياد تخالفي التماثل

dyad, anti-symmetric (skew symmetric)

دياد مساو لسالب مرافقه.

دِیاد متماثل

dyad, symmetric

دياد مساو لمرافقه.

دِياديك

dyadic

مجموع ديادين أو أكثر.

ديادان مترافقان

dyadics, conjugate

ديادان يحصل على أيهما بتبديل المعاملات في كل حد من حدود الآخر ، مثال

 $A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3$, $B_1A_1 + B_2A_2 + B_3A_3$

دِیادان متساویان

dyadics, equal

يقال أن الديادين $\mathbf{Q}_1,\mathbf{Q}_2$ متساويان إذا كان $\mathbf{Q}_1R=\mathbf{Q}_2R$ لكل متجه R في الفراغ الذي يؤثر فيه الدياد.

حاصل الضرب المباشر لديادين

dyads, direct product of

حاصل الضرب المباشر للديادين AB,CD هو الدياد المعرف كالأتي: $\cdot \quad (AB)(CD) = (B.C)AD$

الديثاميكا

dynamics

فرع من الميكانيكا يدرس حركة الأجسام نتيجة لتأثير القوى عليها.

داين

dyne

وحدة القوة في نظام سنتيمتر ــ جرام ــ ثانية (سم ــ جم ــ ث) و تساوى ⁻⁻ 10 نيوتن.

e

e

أساس نظام اللوغاريتمات الطبيعية، وهذا العدد هو نهاية المقدار

 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ عندما تؤول n إلى مالا نهاية. ويساوى أيضا مجموع المتسلسلة اللانهائية

 $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$

وقيمته ... 2.7182818284... ، وقد أثبت العالم "هرميت" (Hermite) فــــى عــام e أن e عدد متسام (transcendental) غير قياسي.

زاوية الاختلاف المركزي

eccentric angle

(angle, eccentric انظر:

دائرتا الاختلاف المركزي لقطع ناقص

eccentric circles of an ellipse

(circles of an ellipse, eccentric: انظر)

أشكال غير متحدة المركز

eccentric configurations

مجموعة من الأشكال الهندسية، لكل منها مركز، وهذه المراكز غير منطبق بعضها على يعض.

اختلاف مركزى

eccentricity

(idu: قطوع مخروطية conic sections)

الدائرة الكسوفية (فلك البروج)

ecliptic

الدائرة العظمى التي يقِطع فيها مستوى مدار الأرض الكرة السماوية، وهمي المسار الظاهري للشمس خلال الحول.

حَرْف

الخط المستقيم (أو القِطعة المستقيمة) الذي يتقاطع فيه وجهان مستويان السكل هندسي. ومن أمثلته أحرف المكعب أو متعدد الأوجه (polyhedron) وأحرف الزاويّـة المتعددة الأوجمه (polyhedral angle) والأحسرف الجانبيسة للمنشور (prism).

مقوِّم كفء

efficient estimator

البار امتر θ له الخاصية التالية: $T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ عير منحاز القيمة المتوقعة $(T-\theta)^2$ تكون قيمة أقل مقارنة بالمقومات الأخرى. العشوائية العشوائية $\{T_n\}$ متتابعة من المقومات تعتمد على العينة العشوائية $\{T_n\}$ $n^{1/2}(T_n-\theta)$ فإنها تكون كفئاً تقريباً إذا كان توزيع ، $x_1,x_2,...,x_n$ يقترب من التوزيع الطبيعي الذي متوسطه الصفر وتباينه و ، وذلك عندما n

الأرقام المصرية

Egyptian numerals

أرقام استعملت في الهيروغليفية حوالي القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد وهي رموز (صور) للتعبير عن ..., 103, 102, 103 ويُعبّر عن الأرقام الأخرى. بتكرار هذه الرموز.

دالة ذاتية

eigenfunction

(eigenvalue فيمة ذاتية) ·

قيمة ذاتية (أو قيمة مميّزة)

eigenvalue

إذا وجد لأي تحويل خطي T على فراغ اتجاهي V متجه غير صفري v ينتمى للفراغ V وكمية قياسية λ يحققان العلاقة

 $Tv = \lambda v$

سميت λ قيمة ذاتية مناظرة للمتجه ν وسمى الأخير متجها ذاتيا (characteristic vector) أو متجها مميِّزا (characteristic vector) للتحويل T. وفي حالة التحويل T الممثل بمصفوفة مربعة A ، تسمى القيم الذاتية بالجذور الذاتية للمصفوفة (characteristic roots of the matrix) وتكون هي جنور المعادلة الجبرية الناتجة من مساواة محدد المصفوفة $(A-\lambda I)$ بالصفر، حيث I مصفوفة الوحدة. وفي المعادلة التكاملية المتجانسة .

 $\lambda y(x) = \int_{a}^{b} k(x,t)y(t)dt$

تكون λ هي القيمة الذاتية و y(x) الحل غير الصفري للمعادلة، أي الدالة الذاتية المناظرة للقيمة الذاتية λ .

(انظر: نظرية هلبرت وشميدت للمعادلات التكاملية ذوات النوى المتماثلة Hilbert-Schmidt theory of integral equations with symmetric kernels, وطيف spectrum وطيف spectrum (Sturm-Liouville differential equation

متجه ذاتي (أو متجه مميّز)

eigenvector

(eigenvalue فيمة ذاتية)

معيار عدم الاختزال لايزنشتاين

Eisenstein's irreducibility criterion

إذا كانت كثيرة الحدود

 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$

 $a_o, a_1, \ldots, a_{n-1}$ فات معاملات صحيحة، ووجد عدد أولى p يقسم كلا من a_o ، وكان p^2 لا يقسم a_o ، فإن كثيرة الحدود تكون غير قابلة للاختزال في مجال الأعداد القياسية.

مرن

elastic

صفة للأجسام التي تستعيد حجمها وشكلها بعد رفع القوى المسببة لتشوهها.

ثوابت (معاملات) المرونة

elastic constants

(انظر: نسبة بواسون Poisson's ratio ومعامل يونج للمرونة elasticity, Young's modulus of (Lamé's constants وثابتا لامي Hooke's law, generalized

مرونة

elasticity

خاصية استعادة الأجسام لأحجامها وأشكالها عند رفع القوى المسببة لتشوهها.

المسألة الأساسية الأولى في نظرية المرونة

elasticity, first fundamental problem of مسألة تعيين الإجهادات والانفعالات داخل جسم إذا عُلمـــت الإزاحــات فــي سطحه.

المسألة الأساسية الثانية في نظرية المرونة

elasticity, second fundamental problem of مسألة تعيين الإجهادات والانفعالات داخل جسم إذا عُلمت القوى المؤثرة فيسي سطحه.

نظرية المرونة

elasticity, theory of الأجسام المرنة وتبحث في حساب الإجهادات والانفعالات الناشئة داخل هذه الأجسام عندما تؤثر فيها قوى خارجية.

معامل المرونة الحجمية

elasticity, volume = bulk modulus خارج قسمة الزيادة في الضغط على التغير في وحدة الحجم ويُعبَّر عنه رياضيا بالمعادلة

$$E = -v \frac{dp}{dv}$$

حيث E معامل المرونة الحجمية، p الضغط، ν الحجم.

معامل يونج للمرونة

elasticity, Young's modulus of مقياس لمرونة الجسم عند التمدد أو الانضغاط ويساوى خارج قسمة الإجهاد على الانفعال الناتج عنه.

قوة دافعة كهربائية (ق.د.ك.)

electromotive force (E.M.F.) فرق الجهد في الدائرة المفتوحة بين قطبي خلية كهربائية أو مولد كهربائي.

قاعدة تراكب المجالات الإلكتروستاتية

electrostatic fields, superposition principle for قاعدة تنص على أن متجه شدة المجال الإلكتروستاتي لمجموعة من الشُدنات هو مجموع متجهات شدة المجال لكل شحنة من هذه الشُدنات.

شدة المجال الإلكتروستاتي

electrostatic intensity

شدة المجال الإلكتروستاتي عند نقطة ما هي القوة المؤثرة في وحدة الشُدنة
الموجبة الموضوعة عند هذه النقطة.

(انظر: قانون "كولوم" للشُحنات النقطيـــة Coulomb's law for point (charges

الجهد الإلكتروستاتي

electrostatic potential الجهد الإلكتروستاتي عند نقطة في الفراغ هو الشغل المبذول ضد المجال الكهربائي لنقل وحدة الشُحنة الموجبة من اللانهاية إلى هذه النقطة وهذا الشغل لا يتوقف على مسار الشُحنة.

الوحدة الإلكتروستاتية للشكنة

electrostatic unit of charge الشُحنة التي إذا وضعت على بعد سنتيمتر واحد من شُحنة مماثلة في الفراغ الفراغ أثرت فيها بقوة مقدارها داين واحد.

نظرية "جاوس" الأساسية في الإلكتروستاتية

electrostatics, Gauss fundamental theorem of

(Gauss fundamental theorem of electrostatics) انظر:

قاسم أوكى لمصفوفة

elementary divisor of a matrix

(matrix, invariant factor of a انظر: عامل لا متغير لمصفوفة)

العمليات الأولية على المحدّدات أو المصفوفات

elementary operations on determinants or matrices

العمليات الآتية:

١- تبديل صفين أو عمودين للمحدّد أو للمصفوفة.

٢- إضافة عناصر صف (عمود) إلى عناصر صف (عمود) آخر.

٣- ضرب عناصر صف أو عمود في ثابت غير صفري.

عنصر هندسى

element, geometrical

١- نقطة أو خط أو مستوى.

٢- كل جزء من أجزاء شكل هندسي مثل أحد أضلاع أو زوايا المثلث.

عنصر فئة

element of a set

أي عنصر من عناصر الفئة.

عنصر التكامل

element of integration

التعبير الذي يتبع علامة (أو علامات) التكامُل في التكامُل المحدد، وإذا كان التكامُل يعبر عن مساحة أو حجم أو كتلة مثلا، فإن عنصر التكامُل يمثل عنصر المساحة

أو الحجم أو الكتلة على الترتيب ويساوي تقريبا مساحة أو حجم أو كتلـــة أي جزء من الأجزاء التي ينقسم إليها التكامل في هــذه الحالــة باعتبـاره نهايــة مجموع.

زاوية الارتفاع

elevation, angle of

(angle of elevation) انظر:

علو نقطة ما

elevation of a given point

ارتفاع النقطة عن مستوى معين.

حذف مجهول (من مجموعة معادلات آنية)

elimination of an unknown (from a set of simultaneous equations) الحصول على مجموعة معادلات جديدة من مجموعة أصلية لا تحتوي على المجهول المراد حذفه وتتحقق لكل قيم المجاهيل المتبقية التي تحقق المعادلات الأصلية. توجد عدة طرق للحذف، منها

الحذف بالجمع أو بالطرح (elimination by addition or subtraction) والحذف بالمقارنة (elimination by comparison) والحذف بالتعويض (elimination by substitution)

قطع ناقص

ellipse

المحل الهندسي في مستوى للنقط التي يكون مجموع بعديها عن نقطتين تلبنتين في (البؤرتين foci) مقدارا ثابتاً. وللقطع الناقص محورا تماثل، يحصر فيهما بداخله قطعتين مستقيمتين، كبراهما طولاً هي المحور الأكلبر (major axis) والأخرى المحور الأصغر (minor axis) للقطع وتلتقيان عند نقطة تسمي مركز (centre) القطع. في مجموعة إحداثيات ديكارتية متعامدة x, y متمركزة عند مركز القطع ومحور السينات فيها منطبق على المحلور الأكلبر، تلخذ معادلة القطع الناقص الصورة القياسية

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

حيث 2a و 2b طولا المحورين الأكبر والأصغر على الترتيب. ويكون الاختلاف المركزي هو

$$e = \frac{1}{a}\sqrt{a^2 - b^2} < 1$$

وتقع البؤرتان عند النقطتين (±ae,0). (انظر: قطوع مخروطية conic sections)

مساحة القطع الناقص

ellipse, area of an

مساحة داخلية القطع الناقص وتساوي πab ، حيث a و b نصف المحورين الأساسيين للقطع.

قطر للقطع الناقص

ellipse, diameter of an

أي قِطعة مستقيمة محدودة بالقِطع الناقص وتمر بمركزه.

الخاصية البؤرية للقطع الناقص

ellipse, focal property of an

خاصية أن الخطين المستقيمين من بؤرتي القطع إلى أي نقطة عليه يميلان بزاويتين متساويتين على المماس للقطع عند هذه النقطة.

وتر بؤري عمودي للقطع الناقص

ellipse, latus rectum of an

وَتَر للقِطع الناقص يمر بإحدى البؤرتين وعمودي على المحور الأكبر للقِطع.

قطوع ناقصة متشابهة

ellipses, similar

قطوع ناقصة لها نفس الاختلاف المركزي.

سطح ناقصى

ellipsoid

سطح مقاطعه المستوية قطوع ناقصة. السطح الناقصي متماثل بالنسبة لثلاثة محاور متعامدة وكذلك بالنسبة لثلاثة مستويات تتحدد بهذه المحاور. تتقاطع هذه المحاور في نقطة هي مركز السطح الناقصي (center). يحصر السطح الناقصي من هذه المحاور قطعا مستقيمة تسمي، وفقا لأطوالها، المحور الأكبر والمحور الأوسط والمحور الأصغر للسطح الناقصي. باختيار محاور متعامدة والمحور الأوسط والمحاور الأكبر والأوسط والأصغر على الترتيب، ينطبق مركز السطح الناقصي على نقطة الأصل O وتأخذ معادلة السطح الناقصي صورتها القياسية:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

حيث 2a و 2b و 2c أطوال المحاور الثلاث. والحجم المحصور بالسطح الناقصي يساوي $\frac{4}{3}\pi abc$.

سطح ناقصى دورانى

ellipsoid of revolution = spheroid

سطح ناقصي يتولد من دوران قطع ناقص حول أحد محوريه ويسمى مقطعته المستوي ذو أكبر قطر " دائرة الاستواء " (equator) ويسمي المحسور السذي حدث حوله الدوران " محور الدوران " كما تسمي نقطتا تقاطع هذا المحور مع السطح الناقصي "القطبين".

سطح ناقصي دوراني مفلطح

ellipsoid of revolution, oblate

سطح ناقصي دوراني طول قطر دائرته الاستوائية أكبر مــن طـول محـور الدوران.

سطح ناقصى دورانى متطاول

ellipsoid of revolution, prolate

سطح ناقصي دوراني طول قطر دائرته الاستوائية أصغر من طـــول محـور الدوران.

الإحداثيات الناقصية الفراغية

ellipsoidal coordinates

(coordinates, ellipsoidal : انظر)

سطوح ناقصية متحدة البؤر

ellipsoids, confocal

(confocal conicoids النظر: سطوح مخروطية متحدة البؤر

سطوح ناقصية متشابهة

ellipsoids, similar

سطوح ناقصية، النسب بين أطوال أقطارها الأساسية ثابتة.

سطح مخروطي ناقصي

elliptic conical surface

سطح مخروطي دليله قِطع ناقص. إذا كان رأس السطح عند نقطية الأصل وكان محوره منطبقا على محور z لمجموعة إحداثيات ديكارتية متعامدة، فإن معادلة السطح تأخذ الصورة:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

ويؤول هذا السطح إلى مخروط دائري قائم (right circular cone) عندما تكون . a=b

إحداثيات ناقصية لنقطة

elliptic coordinates of a point

إحداثيات متعامدة في المستوي تتعين بتقاطع قطاعات ناقصة وزائدة متحــــدة البؤرتين.

أسطوانة ناقصية

elliptic cylinder

(cylinder انظر: أسطوانة

دالة ناقصية

elliptic function

الدالة العكسية $x = \phi(y)$ لتكامل ناقصي y مأخوذ بين الحدين $x = \phi(y)$. x و . x . x الناقص له حاكم الناقص له . x

elliptic functions, Jacobian و انظر: دوال جاكوبي الناقصية دوال فايرشتراس الناقصية والتعالي (elliptic functions, Weierstrassian

دالة ناقصية في متغير مركّب

elliptic function of a complex variable

دالة وحيدة القيمة ومزدوجة الدورة ليست لها نقاط شاذة سوى الأقطاب في أي منطقة محدودة من المستوي المركّب.

دوال جاكوبي الناقصية

elliptic functions, Jacobian

الدوال

sn z, cn z, dn z

المعرفة كالآتي:

$$y=\operatorname{sn}(z,k)=\operatorname{sn}z$$

إذا كان

$$z = \int_{0}^{y} (1 - t^{2})^{-\frac{1}{2}} (1 - k^{2}t^{2})^{-\frac{1}{2}} dt$$

و

$$\mathrm{sn}^2z + \mathrm{cn}^2z = 1$$
 , $k^2\mathrm{sn}^2z + \mathrm{dn}^2z = 1$. cn (0) = dn (0) = 1 بحیث تکون $\mathrm{dn}\,z$, cn z وتؤخذ إشارتا

دالتا فايرشتراس الناقصيتان

elliptic functions, Weierstrassian

الدالتان

$$y' = \frac{dp}{dz}$$
 , $y = p(z)$ حيث $z = \int_{y}^{\infty} S^{-\frac{1}{2}} dt$ الدالة العكسية للدالة $y = p(z)$ حيث $S = 4t^3 - g_2t - g_3 = 4(t - e_1)(t - e_2)(t - e_3)$ وينتج أن $p'(z) \equiv \frac{dp}{dz} = \sqrt{4p^3 - g_2p - g_3}$ والدالتان مزدوجتا الدورة.

تكامل ناقصى

elliptic integral

كل تكامل على الصورة

$$\int R(x, \sqrt{s}) dx$$

حيث

$$s = a_0 x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4$$

كثيرة حدود ليس لها جذور مكررة و a_1,a_0 لا يساويان الصفر معا والدالة $R(x,\sqrt{s})$ قياسية في x و x والتكاملات الناقصية غير التامــة من الأنواع الأول والثاني والثالث هي على الترتيب

$$I_{1} = \int_{0}^{x} \frac{dt}{(1-t^{2})^{\frac{1}{2}}(1-k^{2}t^{2})^{\frac{1}{2}}} = \int_{0}^{x} \frac{d\psi}{(1-k^{2}\sin^{2}\psi)^{\frac{1}{2}}},$$

$$I_{2} = \int_{0}^{x} \frac{(1-k^{2}t^{2})^{\frac{1}{2}}}{(1-t^{2})^{\frac{1}{2}}} dt = \int_{0}^{x} (1-k^{2}\sin^{2}\psi)^{\frac{1}{2}} d\psi,$$

$$I_{3} = \int_{0}^{x} \frac{dt}{(t^{2}-a)(1-t^{2})^{\frac{1}{2}}(1-k^{2}t^{2})^{\frac{1}{2}}} = \int_{0}^{x} \frac{d\psi}{(\sin^{2}\psi-a)(1-k^{2}\sin^{2}\psi)^{\frac{1}{2}}}$$

حيث ϕ . $x=\sin\phi$. يسمي البار امتر k معيار (modulus) التكامل الناقصي . $x=\sin\phi$. وعادة يكون $0 < k^2 < 1$. فتسمي المعيار المتمم . x=1 ($\phi=\frac{\pi}{2}$) عندما تكون x=1 (complete) عندما تكون x=1 الناقصية تامة x=1 (x=1) عندما تكون x=1 (x=1) الناقصية تامة x=1 (x=1) عندما تكون x=1 (x=1) عندما تكون x=1 (x=1) الناقصية تامة (x=1) عندما تكون x=1

$$I_1 = \beta$$
, $I_2 = \int_0^\beta dn^2 t \, dt$, $I_3 = \int_0^\beta (sn^2 t - sn^2 \alpha)^{-1} \, dt$

حيث $a=\sin^2\alpha$, $a=\sin^2\alpha$, $a=\sin^2\beta$ دوال جاكوبي الناقصية. وفي بعض الأحيان يكتِب التكامل الناقصي غير التام من النوع الثاني على الصورة

$$\int_{0}^{x} t^{2} (1-t^{2})^{-\frac{1}{2}} (1-k^{2}t^{2})^{-\frac{1}{2}} dt$$

وقد سمي عالم الرياضيات الفرنسي ليجندر (Legendre) هذه التكاملات ناقصية لأنها ظهرت للمرة الأولى في مسألة حساب طول محيط القِطع الناقص.

الدالة الموديولية الناقصية

elliptic modular function

(modular function, elliptic)

سطح مكافئي ناقصي

elliptic paraboloid

معادلة تفاضلية جزئية ناقصية

elliptic partial differential equation

المعادلة التفاضلية الجزئية الحقيقية من الرتبة الثانية

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \frac{\partial^{2} u}{\partial x_{i} \partial x_{j}} + F(x_{1},...,x_{n},u,\frac{\partial u}{\partial x_{1}},...,\frac{\partial u}{\partial x_{n}}) = 0$$

تكون ناقصية إذا كانت الصيغة التربيعية $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$ محددة الإشارة وغير شاذة. ومن أمثلتها معادلتا لابلاس و بواسون.

نقطة ناقصية على سطح

elliptic point (on a surface)

نقطة يكون دليل ديوبان الخاص بها قطعاً ناقصاً.

سطح ريمان الناقصى

elliptic Riemann surface

(Riemann surface انظر: سطح ريمان)

استطالة

elongation

الزيادة في المسافة بين نقطتين في جسم ما، والاستطالة النسبية (relative elongation) هي خارج قسمة الاستطالة على المسافة الأصلية.

معامل الاستطالة النسبية

elongation, coefficient of relative

معامل الاستطالة النسبية عند نقطة ما من جسم وفي اتجاه معين هو $e=\limrac{\Delta l}{2}$

حيث / المسافة بين هذه النقطة ونقطة قريبة منها مأخوذة في هذا الاتجاه

منحني تجريبي

empirical curve

منحني يلائم مجموعة بيانات الحصائية ويمثل على نحو تقريبي أيـــة بيانــات إضافية من النوع نفسه.

(انظر: طريقة المربعات الصغرى least squares, method of والنظر: طريقة المربعات الصغرى statistical graphing والرسم البياني الإحصائي

صيغة تجريبية

empirical formula

صيغة يمكن التحقق من صحتها بالمشاهدة أو بالتجربة، وليس من الضروري أن تكون مدعومة نظريا.

الفئة الخالية

empty (or null) set

فئة لا تحوي أية عناصر.

إضفاء عملية ضرب قياسى على فراغ اتجاهى

endowment of a vector space with a scalar product تعريف عملية الضرب القياسي لفراغ اتجاهي.

نقطة طرفية

end point

(interval ، فترة curve (انظر: منحنى

طاقة

energy

المقدرة على بذل شغل.

بقاء الطاقة

energy, conservation of

مبدأ ينص على أن الطاقة لا تفني ولا تستحدث. وفي الميكانيكا ينصص هذا المبدأ على انه في مجال قوي محافظ يظل مجموع طاقتي الحركة والوضعة ثابتاً.

تكامل الطاقة

energy integral

تكامُل يبين أن مجموع طاقتي الحركة والوضع لنظام ديناميكي يُطِّل ثابتًاً.

طاقة الحركة

energy, kinetic

 \mathring{m} الطاقة التي يكتسبها جسم ما نتيجة لحركته. وطاقة حركة جسيم كتلته

يتحرك بسرعة ν هي $\frac{1}{2}mv^2$. والشغل المبذول بواسطة قوي مجال محافظ لتحريك جسيم من موضع إلى آخر يساوي التغير في طاقة حركة الجسيم. وطاقة حركة جسم يدور حول محور بسرعة زاوية ω تساوي $\frac{1}{2}I\varpi^2$ ، حيث I عزم القصور الذاتي للجسم حول محور الدور ان.

طاقة الوضع

energy, potential

الطاقة التي يكتسبها جسم ما نتيجة لموضعه. يستخدم هذا التعبير لمجالات القوي المحافظة فقط. وتعرف طاقة الوضع لجسيم عند موضع ما علي أنها سالب الشغل المبذول بواسطة القوي لتحريك الجسيم من موضع معين (تنعدم عنده طاقة الجهد) إلى هذا الموضع.

(energy, conservation of انظر: بقاء الطاقة)

مبدأ الطاقة

energy, principle of

مبدأ ينص على أن الزيادة في طاقة حركة نظام ما تساوي الشــــغل المبـــذول بواسطة القوي المؤثرة في هذا النظام.

معادلات إثبر

Enneper, equations of

معادلات تكاملية لتعيين دوال الإحداثيات للسطح الأدنى مساحة منسَوباً السي منحنياته الأدنى طولا باعتبارها منحنيات بارامترية.

(Weierstrass, equations of انظر: معادلات فايرشتراس

سطح إثير

Enneper, surface of

(surface انظر: سطح)

دالة صحيحة

entire function = integral function

دالة يمكن فكها على هيئة متسلسلة مكلورين. وهذا المفكوك يتقارب لجميع القيم المحدودة للمتغير. وتكون الدالة ذات المتغير المركب صحيحة إذا كانت دالــــة تحليلية عند كل القيم المحدودة للمتغير.

متسلسلة صحيحة

entire series

متسلسلة قوي تتقارب لجميع قيم المتغير. مثال ذلك المتسلسلة الأسية $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$

فئة قابلة للعد

enumerable set = countable set

فئة تحتوى على عدد لا نهائي من العناصر القابلة للعد ويمكن وضع عناصرها في تناظر أحادي مع الأعداد الصحيحة الموجبة.

غلاف منحنيات عائلة أحادية البارامتر

envelope of a one-parameter family of curves

منحني يمس جميع منحنيات عائلة أحادية البارامتر.

مثال ذلك: الغلاف لعائلة الدوائر $(x-a)^2 + y^2 - 1 = 0$ يتكون من المستقيمين

غلاف عائلة سطوح أحادية البارامتر

envelope of a one-parameter family of surfaces

envelope of a one-parameter ramny or surractor meder and parameter ramny or surractor meder and meder and parameter ramny or surractor medical med


(انظر: مميّز عائلة من السطوح أحادية البار امتر

(characteristic of a one-parameter family of surfaces

دویری (سیکلوید) فوقی

epicycloid

المحل الهندسي المستوي لنقطة ثابتة على محيط دائرة عندما تتدحرج هندنه الدائرة على محيط دائرة أخرى ثابتة من الخارج بحيث تظل الدائرتان فــــي مستوي واحد. انظر الشكل



منحنى فوقى شبه عجلاني (إبيتروكويد)

epitrochoid

تعميم لمنحني الدويري الفوقي بحيث تكون النقطة المولدة للمنحني هـــي أي نقطة ثابتة على نصف قطر الدائرة المتدحرجة أو على امتداده. (انظر: دويري فوقي epicycloid و شبه العجلاني trochoid)

منحنى فوقى عجلاني فراغي

epitrochoidal curve

المحل الهندسي لنقطة في مستوي دائرة تتدحرج بدون انزلاق على دائسرة أخرى ومستويا الدائرتين يصنعان معا زاوية ثابتة. وهسنده المنحنيات هي منحنيات كروية.

(spherical curve (انظر: منحني كروي)

ε – aulum

epsilon-chain

تتابع محدود من النقط $p_1,p_2,...,p_n$ المسافحة بين أي نقطتين متتاليتين فيسه أقل من ε ، حيث ε عدد حقيقي موجب.

ε

epsilon symbols

الرموز $\varepsilon_{i_1,i_2,\dots,i_k}$, $\varepsilon_{i_1,i_2,\dots,i_k}$, وتساوي صفراً إلا إذا كانت الأعداد الصحيحة i_1,i_2,\dots,i_k ترتيبا للأعداد i_1,i_2,\dots,i_k وفي هذه الحالة تساوي أي مسن الكميتين (i_1,i_2,\dots,i_k أو (i_1,i_2,\dots,i_k الجميتين (i_1,i_2,\dots,i_k أو فردية.

متساوية

equality

علاقة تساو وهي تقرير بأن شيئين متساويان، ويُصاغ هذا التقرير عسادة في صورة معادلة.

متساوية متواصلة

equality, continued

تساوي ثلاث كميات أو أكثر بواسطة علامتي تساو أو أكثر في تعبير متواصل مثل

$$f(x,y) = g(x,y) = h(x,y)$$
 و التعبير الأخير يكافئ المتساويتين $a=b=c=d$. $f(x,y) = g(x,y)$, $g(x,y) = h(x,y)$

جذور متساوية لمعادلة

equal roots of an equation

(multiple root of an equation فظر: جذر مكرر لمعادلة)

معادلة

equation

تقریر تساو بین تعبیرین. والمعادلات نوعان: متطابقات ومعادلات شرطیة، (ویعرف النوع الأخیر عادة باسم معادلات) وتکون المعادلة الشرطیة صحیحة فقط لبعض قیم المتغیر الوارد فی هذه المعادلة. فمثلا، یکون التقریر xy+y-3=1 للمتغیر x. کذلك تتحقق المعادلة xy+y-3=1 المتغیر x. کذلك تتحقق المعادلة xy+y-3=1 المتغیرین xy+y-3=1 و لأزواج کثیرة أخري لقیم المتغیرین x, y و لأزواج کثیرة أخري لقیم المتغیرین x, y و لا تتحقق لکثیر من قیم هذین المتغیرین. ویطلق اسم "حلی " أو " ولکنها أیضا لا تتحقق لکثیر من قیم هذین المتغیر (أو علی تلک الفئه من قیم المتغیرات فی حالة وجود أکثر من متغیر) التی تتحقق لها المعادلة. وکثیرا ما تسمی المعادلة غیر قیاسیة أو صماء إذا ظهر المتغیر فیها تحت علمة الجذر أو مرفوعا لأس کسری مثل أو صماء إذا ظهر المتغیر فیها تحت علمة الجذر أو مرفوعا لأس کسری مثل

وتسمي المعادلة مثلثية (trigonometric) إذا ظهر المتغير في دالة مثلثية مثل

$$\cos x - \sin x = \frac{1}{2}$$

ويقال للمعادلة إنها أسية (exponential) إذا وجد المتغير في الأس كما فيي المعادلة

$$2^x - 5 = 0$$

معادلة مساعدة

equation, auxiliary

(انظر: المعادلة التفاضلية الخطية العامـة differential equation, general (linear

معادلة منتقصة

equation, defective

معادلة يقل عدد جذورها عن عدد جذور معادلة أصلية استنتجت تلك المعادلة الأولى منها. وتفقد بعض الجذور مثلا بقسمة طرفي المعادلة الأصلية على دالة ما في المتغير. فإذا قسم طرفا المعادلة $x^2 + x - 2 = 0$ كان الناتج $x^2 + x - 2 = 0$. وتعد المعادلة الأخيرة منتقصة في هذه الحالسة إذ إن الجذر x = 0 قد فقد.

معادلة متجانسة

equation, homogeneous

(homogeneous equation) انظر:

مُعادَلَة غَيْر مُحَدَّدَة

equation, indeterminate

معادلة تحتوي على أكثر من متغير ولها عدد غير محدود من الحلول. مثال ذلك المعادلة 2x + y = 1. يرجع الاهتمام بمثل هذه المعادلات تاريخيا إلى ما يسمي بالمعادلات الديوفانتية (Diophantine equations) التي تكون فيسها المعادلات أعداداً صحيحة ويدور البحث فيها عن فئات الحلول في فئة الأعداد الصحيحة. ويقال لمجموعة من المعادلات الخطية إنها غير محدَّدة إذا كان لهذه المجموعة عدد لانهائي من الحلول.

(consistent system of equation انظر: نظام متآلف من المعادلات)

مُعادَلَة في الصورة P

equation in P-form

معادلة كثيرة حدود (polynomial) في متغير واحد معامل الحد الأعلى درجـــة فيها هو الواحد الصحيح ومعاملات الحدود الأخرى أعداد صحيحة.

المَحَلّ الهَنْدَسي لمُعادَلَة

equation, locus of an

(انظر: محل هندسي locus)

معادلة لوغاريتمية

equation, logarithmic

معادلة تحتوي على لوغاريتم المتغير وتطلق هذه التسمية عادة على المعلدلات التي يظهر فيها المتغير داخل دالة اللوغاريتم. مثال ذلك، المعادلة مسم

 $\log x + 2\log 2x + 4 = 0$

المعادلة الأدنى

equation, minimal (or minimum)

(انظر: عدد جبري algebraic number

و المعادلة المميّزة لمصفوفة characteristic equation of a matrix

معادلة عددية

equation, numerical

معادلة معاملات متغيراتها وحدها المطلق أعداد وليست رموزا. مثال ذلك المعادلة

 $2x^2 + 5x + 3 = 0$

معادلة الاتصال

equation of continuity

في ميكانيكا الأوساط المتصلة: المعادلة

$$div(\rho q) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

تعبر عن قانون بقاء الكتلة، حيث ρ الكثافة الحجمية للكتلة، t الزمن، q متجه سرعة الوسط، (div) المؤثر التفاضلي لتباعد المتجه. في النظرية الكهرومغنطيسية: تعبر المعادلة عن قانون بقاء الشحنة الكهربية وتكتب كما في ميكانيكا الأوساط المتصلة مع اعتبار أن ρ هي الكثافة الحجمية للشحنة الكهربية، q سرعة الشحنات في الوسط، pq متجه كثافة التيار الكهربي.

معادلة الحركة

equation of motion

معادلة تعبر عن قانون حركة جسيم، وهي عادة معادلة تفاضلية.

المعادلة العامة من الدرجة النونية في متغير واحد

equation of the n- th degree in one variable, the general

معادلة كثيرة حدود من الدرجة النونية ذات معاملات ثابتة، مثل المعادلة

$$a_o x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n = 0$$

يقال لمعادلة كثيرة حدود من الدرجة النونية إنها "كاملة" إذا كانت كل معاملاتها غير صفرية. وتكون المعادلة "غير كاملة " إذا كان أحد معاملاتها

(غير معامل x'') على الأقل مساويا للصفر. وتسمي معادلة كثيرة الحدود معادلة خطية أو تربيعية أو تكعيبية إذا كانت من الدرجة الأولي أو الثانيــة أو الثالثة على الترتيب.

(equation, numerical عددية)

المعادلة العامة من الدرجة الثانية في متغيرين

equation of the second degree in two variables, the

المعادلة:

 $ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$ حیث x, y متغیر ان و الثو ابت a, b, c لیست کلها أصفار ا. (discriminant of a quadratic form انظر: ممیرِّز صیغة تربیعیة

معادلة كثيرة الحدود

equation, polynomial

معادلة تنتج بمساواة كثيرة حدود في متغير واحد أو في عدة متغيرات بالصفر. وتكون درجة المعادلة هي نفسها درجة كثيرة الحدود.

(degree of a polynomial or equation انظر: درجة كثيرة حدود أو معادلة)

معادلة عكسبة

equation, reciprocal

(reciprocal equation : انظر)

معادلة مزيدة

equation, redundant

معادلة جذورها هي جذور معادلة معطاة مضافا إلىها جذور أخرى نتجت عن إجراء عمليات على المعادلة المعطاة، مثل ضرب طرفي هذه المعادلة في نفس الدالة للمتغير أو رفع الطرفين لنفس الأس. تسمي هذه الجذور جذورا "مزيدة" أو "دخيلة". مثال ذلك عند تربيع طرفي المعادلة x = 1 تنتج المعادلة x = 1 ولها جذران x = 1 ، والأخيرة معادلة مزيدة إذ إن الجذر x = 1 لا يحقق المعادلة الأصلية.

تحويل معادلة

equation, transformation of an

(transformation انظر: تحویل)

معادلات الملاءمة (في نظرية المرونة)

equations, compatibility (in Elasticity)

(compatibility equations : انظر)

معادلات غير متآلفة

equations, inconsistent

(consistent system of equations

(انظر: نظام متآلف من المعادلات

معادلات بارامترية

equations, parametric

(parametric equations : انظر)

معادلات آنية

equations, simultaneous

(simultaneous equations

(انظر:

نظرية المعادلات

equations, theory of

(theory of equations : انظر:

خط الاستواء

equator

الدائرة العظمى لكرة في المستوي العمودي على الخط الواصل بين قطبيها.

خط الاستواء السماوي (الدائرة الاستوائية السماوية)

equator, celestial

الدائرة العظمى التي يقِطع فيها مستوي خط الاستواء الأرضى الكرة السماوية.

خط الاستواء لمجسم ناقصى دورانى

equator of an ellipsoid of revolution

(انظر: سطح ناقصىي دوراني ellipsoid of revolution)

مضلع متساوي الزوايا

equiangular polygon

مضلع كل زواياه الداخلية متساوية. والمثلث المتساوي الزوَّايَّا يكُون بالضرورة

متساوي الأضلاع. أما أضلاع المضلع المتساوي الزوايا الذي له أكسثر من ثلاثة أضلاع فليست متساوية بالضرورة.

مضلعان متساويا الزوايا المتناظرة

equiangular polygons, mutually

مضلعان تتساوى كل زاويتين متناظرتين فيهما.

حلزون متساوي الزوايا- الحلزون اللوغاريتمي

equiangular spiral = logarithmic spiral

(logarithmic spiral : انظر)

تحويل حافظ للزوايا

equiangular transformation = isogonal transformation

(isogonal transformation (انظر:

راسم حافظ للمساحة

equiareal map = area preserving map

(انظر: راسم map)

دوال متساوية الاتصال

equicontinuous functions

تكون متتابعة الدوال $\{f_n(x)\}$ متساوية الاتصال على الفئة S إذا وجد لأي عدد متدابعة الدوال $\{f_n(x_1) - f_n(x_2) | < 0 \}$ بحيث يكون S بحيث عدد آخر S بحيث يكون S من S ولجميع قيم S من S من S ولجميع قيم S من S من S ولجميع قيم S من S من S من S ولجميع قيم S من S

متساوى البغد

equidistant

صفة تفيد تساوى البُعد مثل تساوى بُعدى نقطة عن نقطتين معلومتين.

نظام من المُنحنيات البارامِثرية المتساوية البعد على سطح

equidistant system of parametric curves on a surface

(parametric curves on a surface, equidistant system of انظر:

مضلع متساوي الأضلاع

equilateral polygon

مضلع تتساوى أطوال أضلاعه.

مضلع كروي متساوي الأضلاع

equilateral spherical polygon

مضلّع مرسوم على كرة أضلاعه أجزاء من دو أثر عظمي ومتسأوية.

اتزان جسم

equilibrium of a body

يكون الجسم في حالة اتزان إذا تلاشت محصلة القوى المؤثرة فيه وتلاشتى أيضا مجموع عزوم هذه القوى بالنسبة لأية نقطة في الفراغ.

اتزان جسيم

equilibrium of a particle

يكون الجسيم في حالة اتزان إذا تلاشت محصلة القوى المؤثرة فيه.

اتزان القوى

equilibrium of forces

خاصية لمجموعات القوى في نظام ما، يتلاشى فيها مجموع متجهات القرق وكذلك مجموع عزوم هذه القوى بالنسبة لأية نقطة في الفراغ.

سطح تساوى الجهد

equipotential surface

سطح تأخذ دالة الجهد عليه قيمة ثابتة.

فصل تكافؤ

equivalence class

إذا عرفت علاقة تكافؤ على فئة فإنه يمكن تقسيم هذه الفئة إلى فصول - تسمى فصول تكافؤ - بحيث يقع أي عنصرين من عناصر هذه الفئة في فصل واحد إذا، وفقط إذا، كانا متكافئين. يتطابق فصلان من فصول التكافؤ إذا احتويا على عنصر مشترك من عناصر الفئة. وينتمي كل عنصر من عناصر الفئة إلى أحد فصول التكافؤ. فمثلاً يمكن تعريف علاقة تكافؤ على فئة الأعداد الحقيقية كالآتي: يتكافأ العددان a, b إذا كان الفرق a-b عددا قياسيا. في هذه

الحالة سيحتوي الفصل الذي ينتمي إليه العنصر a على كل الأعداد التي تنتج بإضافة أي عدد قياسي إلى a .

تكافؤ تقريرين

equivalence of propositions

نقرير تكافؤ يتكون من تقريرين معطيين تربطهما عبارة الذا وفقط إذا ". ويكون التكافؤ صائبا إذا كان كلا التقريرين صائبا أو إذا كان كلاهما خاطئا. فمثلا، التقرير اليكون المثلث متساوي الزوايا إذا، وفقط إذا، كان متساوي الأضلاع هو تقرير صائب لأنه إما أن يكون المثلث متساوي الزوايا وأيضا متساوي الأضلاع وإما أن يكون غير متساوي الزوايا وأيضا غير متساوي الأضلاع. ويكتب التكافؤ المكون من التقريرين p,q عادة على الصورة $p \neq q$ أو $p \equiv q$

ويعني هذا أن "تحقق p هو الشرط اللازم والكافي لتحقق p" أو "يتحقق p إذا، وفقط إذا، تحقق p".

علاقة تكافؤ

equivalence relation

علاقة بين عناصر فئة معطاة تحقق خواص الانعكاس والتماثل والانتقال و ويجعل

عنصرين من هذه الفئة متكافئين أو غير متكافئين.

زوايا متكافئة

equivalent angles

زوايا لها نفس القياس وتكون بالتالي متطابقة.

معادلات متكافئة

equivalent equations

 $x^2=1$, $x^4=2x^2-1$ معادلات لها نفس فئات الحل، فمثلا المعادلتان . $\{1,-1\}$ متكافئتان لأن فئة حل كل منهما هي

أشكال هندسية متكافئة

equivalent geometric figures

(equivalence relation) انظر: علاقة تكافؤ

متباينات متكافئة

equivalent inequalities

|x-3| < 2 , 1 < x < 5 متباینات لها نفس فئسات الحسات الحسل، فمثسلا المتباینتسان (1,5) . متكافئتان لأن فئة حل كل منهما هي الفترة المفتوحة (1,5) .

مصفوفتان متكافئتان

equivalent matrices

P , Q بحیث توجد مصفوفتان مربعتان غیر شاذتین A , B تحققان

A = PBQ

وتتكافأ المصفوفتان المربعتان إذا، وفقط إذا، أمكن الحصول على إحداهما من الأخرى بإجراء عدد محدود من العمليات التالية:

١- تبديل صفين أو عمودين.

٢- إضافة مضاعف صف إلى صف آخر أو مضاعف عمود إلى عمود آخر.

٣- ضرب أي صف أو عمود في ثابت غير صفري.

ولكل مصفوفة توجد مصفوفة قطرية مكافئة. والتحويل PBQ للمصفوفة B هو تحويل مكافئ (equivalent transformation). ويسمي هذا التحويل تحويل $P=Q^{-1}$ (similarity (or collineatory) transformation) إذا كانت Q هي مدور Q، وتحويل تطابق (congruent transformation) إذا كانت Q هي المرافق (conjunctive transformation) المحموفة Q وتحويل عموديا (orthogonal transformation) الحاديا المحافوفة Q وكانت Q مصفوفة عمودية، وتحويلا أحاديا (unitary transformation) إذا كانت Q مصفوفة عمودية، وتحويلا أحاديا الحاديا المحافوفة Q وكانت Q مصفوفة أحاديا المحافوفة وكانت Q مصفوفة المحافونة وكانت Q مصفوفة وكانت Q مصفوفة المحافونة وكانت Q مصفوفة المحافونة وكانت Q مصفوفة وكانت Q وكانت Q مصفوفة وكانت Q وكانت Q مصفوفة وكانت Q مصفوفة وكانت Q مصفوفة وكانت Q وكانت Q مصفوفة وكانت Q وكانت Q وكانت Q وكانت Q مصفوفة وكانت Q وك

(transformation (انظر: تحویل)

القيمة الحالية

equivalent of an annuity, cash = present value

(value قيمة)

دوال تقريرية متكافئة

equivalent prepositional functions = open sentences = statement functions

(prepositional function انظر: دالة تقريرية

فئات متكافئة

equivalent sets = equinumerable sets = equipotent sets فئات يمكن وضع عناصرها في تناظر واحد لواحد.

فراغات متكافئة طويولوجيا

equivalent spaces, topologically

(itde : تحویل طوبولوجی topological transformation

غربال " إراطوستسنيس "

Eratosthenes, sieve of

تعيين كل الأعداد الأولية التي ليست أكبر من عدد معطى N وذلك بكتابية كل الأعداد من Z إلى N ثم حذف مضاعفات العدد 2 ثم حـــذف مضاعفات العدد 3 والاستمرار حتى يتم حذف كــل مضاعفات الأعــداد الأولية التي ليست أكبر من \sqrt{N} فيما عدا الأعداد الأولية نفسها ولا تتبقــى بعد ذلك إلا الأعداد الأولية المطلوبة.

الإرج

erg

وحدة للشغل قيمتها الشغل المبذول بواسطة قوة مقدارها داين واحد عند إزاحــة نقطة تأثيرها مسافة سنتيمتر واحد في اتجاهها.

النظرية الإرجوية المتوسطة

ergodic theorem, mean

نظرية أضعف من نظرية بيركوف الإرجوية تنص على أنه تحت نفس فروض نظرية بيركوف تتحقق نفس النتيجة ولكن بتقارب في المتوسط من الرتبة الثانبة.

نظرية "بيركوف" الإرجَوية

ergodic theorem of Birkhoff

نظرية تنص على أنه إذا كان T تحويلاً نقطياً محافظاً على القياس من الفترة (0,1) فوق نفسها وكانت الدالة f قابلة للتكامل بمفهوم ليبيج على الفترة (0,1) فإنه توجد دالة قابلة للتكامل بمفهوم ليبيج على الفترة (0,1) بحيث تتحقق المتساوية

$$f^{*}(x) = \lim \frac{f(x) + f(Tx) + \ldots + f(T^{n}x)}{n+1}$$

تقريباً عند كل نقطة في الفترة.

النظرية الإرجوية

ergodic theory

خطأ

error

الفرق بين عدد ما والعدد الذي يقرب إليه. فإذا كان X هو العدد ، وكان A تقريب العدد X فإن الخطأ هو E=A-X والخطأ النسبي error) هو $\frac{E}{X}$ ويعرف أحيانا بأنه $\left|\frac{E}{X}\right|$ ، والخطأ المئوي error) هو الخطأ النسبي معبرا عنه في صورة نسبة مئوية.

الخطأ (في الإحصاء)

error (in Statistics)

١- التغير في القياس نتيجة لعوامل لا يمكن التحكم فيها. ً

وإذا كانت هذه العوامل كثيرة العدد ومستقلة بعضها عن بعضض ومتساوية تقريبا وذات تأثير تراكمي على التغير حول ثابت ما أو قيصة متوقعة فإ الانحرافات تكون موزعة توزيعا طبيعيا حول هذا الشابت أو هذه القيمة المتوقعة. ويفترض أن القياس يتأثر بمثل هذه العوامل ومن ثم يسمي منحني الخطأ (error curve).

 \dot{Y} التغير في القيم المتوقعة لمتغير ما نتيجة لعملية أخذ العينات وتسمي عادة أخطاء أخذ العينات (sampling errors).

٣- في اختبار أت الفروض يكون أ الخطأ من النوع الأول "

(error of the first type) وفقا لتعريف نيمان وبيرسون هـو خطـا اسـتبعاد فرض صحيح. أما الخطأ من النوع الثاني (error of the second type) فـهو القبول الخاطئ لفرض غير صحيح.

دالة الخطأ

error function

إحدى الدوال الآتية

$$Erf(x) = \int_{0}^{x} e^{-t^{2}} dt$$


$$Erfc(x) = \int_{x}^{\infty} e^{-t^{2}} dt$$

$$Erfi(x) = \int_{0}^{x} e^{t^{2}} dt = -i.Erf(ix)$$

الدائرة الماسة لمثلث من الخارج

escribed circle of a triangle

دائرة تمس أحد أضلاع مثلث وامتدادي ضلعيه الأخرين. انظر الشكل:



ثابت أساسى

essential constant

(constant انظر: ثابت

راسم أساسى

essential mapping

يكون الراسم من فراغ طوبولوجى إلى فراغ طوبولوجى آخر أساسيا إذا لـــم يكن هوموتوبيا (homotopic) لراسم مداه نقطة واحدة. (انظر: تشكّل متصل deformation, continuous)

دالة محدودة أساسا

essentially bounded function

(bounded function, essentially: انظر)

تقدير (في الإحصاء)

estimate (in Statistics)

١- مجموعة القيم العددية التي تعطي لبار امترات دالة التوزيع على أساس شواهد من العينات.

٢- تقرير عن قيم بعض بارامترات أو خواص الدوال مبنية على شواهد.

تقدير غير منحاز ذو أقل تباين

estimate, minimum variance unbiased

ركون الإحصاء غير المنحاز t_n المستنتج خطيا من عينة عشوائية بعدد $E(t_n-T)^2$ أصغر منه مشاهدة تقدير اذا أقل تباين للبار امتر T إذا كان $E(t_n-T)^2$ أصغر منه $E(t_n)$ من عينة لها نفس الحجم ، حيث هي القيمة المتوقعة للإحصاء .

تقدير غير منحاز

estimate, unbiased

 $E(t_n) = T$ يعتبر الإحصاء t_n تقديرا غير منحاز للبار امتر t_n إذا كان t_n لكل t_n حيث $E(t_n)$ هي القيمة المتوقعة للإحصاء t_n

خوارزمية إقليدية

Euclidean algorithm

(algorithm انظر: خوارزمیة

الهندسة الإقليدية

Euclidean geometry

(geometry هندسة)

حلقة إقليدية

Euclidean ring

هي حلقة إبدالية R تناظرها دالة n مجال تعريفها R مع حذف الصغر ونطاقها فئة من الأعداد الصحيحة غير السالبة والحلقة تحقق:

 $xy \neq 0$ اذا کان $n(xy) \geq n(x) - 1$

 $x \neq 0$ بحیث x, y یوجد عنصران y = qx + r او y = qx + r او

فراغ إقليدي

Euclidean space

n فئة من العناصر كل منها على صورة n من الأعداد الحقيقية المرتبـة $x=x_1,x_2,...,x_n$

$$\rho(x, y) = \left[\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

ويسمى العدد n بُعد الفراغ الإقليدي. * ٢- فراغ خطي معرف عليه عملية الضرب القياسي.

فراغ إقليدى محليا

Euclidean space, locally

فراغ طوبولوجى T ناظره عدد صحيح n بحيث يوجد لأي نقطة من T جوار متشاكل طوبولوجيا مع فئة مفتوحة في فراغ إقليدي ذي n بعدد. في هذه الحالة يكون بعد الفراغ T هو n. والمسألة الخامسة من مسائل هلبرت تنص على أن أي فراغ إقليدي محليا يكون متشاكلاً بنائيا مع زمرة "لى ".

زوايا "أويلر"

Euler angles

ثلاث زوایا لتحدید اتجاهات ثلاثة محاور دیکارتیة متعسامدة بالنسبة لثلاثة محاور متعامدة أخرى.

مميِّز "أويلر"

Euler characteristic

١- مميِّز أويلر لمنحنى هو الفرق بين عدد الرؤوس وعدد القِطع عند تقسيم المنحني إلى قِطع بواسطة نقاط (رؤوس) بحيث تكافئ كل قِطعة، مضافا إليها نقطتا البداية والنهاية، طوبولوجيا قِطعة مستقية مغلقة.

٢- مميز أويلر لسطح هو عدد الرؤوس مطروحاً منه عدد الأحرف ومضافاً الله عدد الأوجه عند تقسيم السطح إلى أوجه بواسطة عدد من الرؤوس والأحرف بحيث يكافئ كل وجه طوبولوجيا مضلعاً مستوياً. ولا يتوقف مميز أويلر على طريقة التقسيم في كل من حالتي المنحني والسطح.

n هو K (simplicial complex) خي بعد مميّز أويلر لمجمع تبسيطات K العدد ا

$$x = \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r} s(r)$$
 . K في $s(r)$ عدد التبسيطات ذات البعد $s(r)$

(simplex نبسيطة)

ثابت "أويلر" = ثابت "ماسكيروني"

Euler constant = Mascheroni's constant

نهاية المقدار

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \log n$$

عندما تؤول n إلى مالا نهاية ويساوى ...0.5772157 . وليس معلوما إذا كان ثابت أويلر عددا قياسيا أو غير قياسي.

قاعدة "أويلر" للمتبقى

Euler criterion for residues

(انظر: المتبقى residue)

معادلة "أويلر" = معادلة "أويلر و لاجرانج"

Euler equation = Euler-Lagrange equation

ا- معادلة تفاضلية على الصورة

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = f(x)$$
..., a_0, a_1, \dots, a_n

وقد درس أويلر هذا النوع من المعادلات حوالي 1740، ولكن الحل العام لـــها كان معروفا لدي جون برنوللي منذ عام 1700.

٢-في حساب التغيرات (Calculus of Variations)، هي المعادلة التفاضلية

$$y = \frac{dy}{dx}$$
 $(\frac{\partial f(x,y,y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x,y,y')}{\partial y'}\right) = 0$

وتحقق هذه المعادلة شرطا لازما لكى تكون قيمة التكامل

$$\int_{a}^{b} f(x,y,y')dx$$

أقل ما يمكن. وقد توصل العالم أويلر لهذا الشرط عام 1744 ، كما توصل أيضا للشرط اللازم للحصول على أقل قيمة للتكامل

$$\int_{a}^{b} f(x,y,y',...,y^{(n)})dx$$

وهذا الشرط هو

$$y^{(r)} = \frac{d^r y}{dx^r}$$
 حيث
$$\frac{\partial f}{\partial y} + \sum_{r=1}^n (-1)^r \frac{d^r}{dx^r} \left\{ \frac{\partial f}{\partial y^{(r)}} \right\} = 0$$
 أما بالنسبة للتكامل الثنائي
$$\iint_s f(x, y, z, z_x, z_y) dx dy$$

حيث

$$z_x = \frac{\partial z(x,y)}{\partial x}$$
 , $z_y = \frac{\partial z(x,y)}{\partial y}$ فإن معادلة أويلر تأخذ الشكل $\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial z_x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z_y} \right) = 0$

(Calculus of Variations انظر: حساب التغير ات

معادلة "أويلر"

Euler, equation of

المعادلة

$$\frac{1}{R} = \frac{\cos^2 \theta}{\rho_1} + \frac{\sin^2 \theta}{\rho_2}$$

حيث $\frac{1}{R}$ الانحناء العمودي لاتجاه ما عند نقطة من السطح، θ الزاويــة بين الاتجاهين اللذين انحناءهما العموديان $\frac{1}{\rho_1}$, $\frac{1}{\rho_2}$ (curvature)

صيغة "أويلر"

Euler formula

الصيغة

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x$$
 . $i=\sqrt{-1}$ عدد حقیقی و x حیث e^{ix} الدالة e^{ix}

(لعدد صحیح ϕ اویلر ϕ ا

Euler ϕ -function (of an integer)

دالة قيمتها لعدد صحيح ما، هي عدد الأعداد الصحيحة الأولية بالنسبة له، ولا تزيد عليه. إذا كان العدد الصحيح هو

$$n = a^p b^q c^r \dots$$

حيث a,b,c أعداد غير جذرية غير متساوية، فإن الدالة ϕ لهذا العدد هي

$$\phi(n) = n(1 - \frac{1}{a})(1 - \frac{1}{b})(1 - \frac{1}{c})....$$

أما قيمة الدالة ø للأعداد الصحيحة 1,2,3,4 فهي على الترتيب 1,1,2,2.

صيغة "أويار و مكاورين" للمجموع

Euler-Maclaurin sum formula

صيغة لتقريب تكامل محدد

$$\int_{a}^{b} f(x) dx$$

حيث f لها مشتقات متصلة من جميع الرتب حتى أعلى رتبة مستخدمة عند كل نقط الفترة [a,b] و b-a=m عدد صحيح، والصيغة هي

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \frac{1}{2} [f(a) + f(d)] + \sum_{r=1}^{m} f(a+r) - \frac{1}{2} \frac{Br}{(2r)^{1}} [f^{(2r-1)}(b) - f^{(2r-1)}(a)] - f^{2n}(\theta m) \frac{mB_{n}}{(2n)^{1}}$$

$$E_{n} \cdot 0 \le \theta \le 1$$

$$E_{n} \cdot 0 \le \theta \le 1$$

$$E_{n} \cdot 0 \le \theta \le 1$$

(انظر: أعداد "برنوللي" Bernoulli's numbers)

نظرية "أويلر" للدوال المتجانسة

Euler's theorem on homogeneous functions

نظرية تنص على أن حاصل ضرب دالة متجانسة من الدرجة n للمتغيرات في العدد n يساوي مجموع حاصلات ضرب كل من هذه المتغيرات في المشتقة الجزئية للدالة بالنسبة لهذا المتغير ، فمثللا إذا كانت $f(x,y,z) = x^2 + xy + z^2$

$$2(x^2 + xy + z^2) = x(2x + y) + y(x) + z(2z)$$

نظرية "أويلر" لمتعددات الأوجه

Euler theorem for polyhedrons

نظرية لمتعددات الأوجه تنص على أن

V-E+F=2

حيث V عدد الرؤوس و E عدد الأحرف و F عدد الأوجه.

تحويل "أويلر" للمتسلسلات

Euler transformation of series

تحويل للمتسلسلات التذبذبية يزيد من سرعة تقاربها إذا كانت تقاربية ويعرف مجموعاً لها في بعض الحالات إن كانت تباعدية. فالمتسلسلة

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$$

تتحول بتحويل أويلر إلى

$$\frac{a_0}{2} + \frac{a_0 - a_1}{2^2} + \frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2^3} + \dots = \sum \frac{\Delta^n a_0}{2^n}$$

حيث

$$\Delta^n a_0 = a_0 - \binom{n}{1} a_1 + \binom{n}{2} a_2 \dots + (-1)^n a_n$$

 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\dots$

فمثلا، تتحول المتسلسلة التقاربية

إلى $\frac{1}{2 \times 2^2} + \frac{1}{2 \times 2^2} + \frac{1}{3 \times 2^3} + \dots$ إلى $\frac{1}{2} + 0 + 0 + 0 \dots$ إلى $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

دالة زوجية

even function

(function, even (انظر: دالة زوجية

عدد زوجي

even number

عدد يقبل القسمة على 2 ومن ثم يمكن كتابة كل الأعداد الزوجيــة علـى الصورة 2n ، حيث n عدد صحيح.

تبديل زوجي

even permutation

(permutation انظر: تبدیل)

حدث

event

١- فئة جزئية معينة من نواتج ممكنة لتجربة ما تتكرر عددا مدودا من المرات

(أو عددا غير محدود قابل للعد). يتحقق الحدث إذا كان ناتج المشاهدة عنصرا من هذه الفئة. فمثلاً عند رمى زهري النرد، تكون الفئة $\{(3,6),(4,5),(5,4),(6,3)\}$ هي حدث (يمكن وصف هذه الحدث بفئة المجموع و) والأحداث هنا هي الفئات الجزئية لفئة كل الأزواج المرتبة $\{(m,n)\}$ حيث كل من $\{(m,n)\}$ و $\{(m,n)\}$ حيث كل من $\{(m,n)\}$ و المحيدة $\{(m,n)\}$ حيث كل من $\{(m,n)\}$

E إذا أعطيت فئة T فإن الحدث هو عنصر من مجموعـــة E مــن الفئات الجزئية للفئة T لها الخواص الآتية:

i - T عنصر من T - أ

(probability function النظر: دالة الاحتمال)

حدث مركّب

event, compound

(idu:) (compound event

أحداث مرتبطة

events, dependent

يكون الحدثان مرتبطين إذا كان حدوث أو عدم حدوث أحدهما يغير من احتمال حدوث الآخر.

أحداث مستقلة

events, independent

أحداث غير مرتبطة.

(events, dependent مرتبطة إنظر: أحداث مرتبطة

حدثان متنافيان

events, mutually exclusive

حدثان يمنع حدوث أحدهما حدوث الآخر، أي حدثان تقاطعهمًا هو الفئة الخالية، فمثلا عند رمي قِطعة نقود ينفي ظهور أحد الوجهين ظهور الوجه الآخر.

مطور المنحنى (المنحنى المنشئ لمنحنى)

evolute of a curve

المحل الهندسي لمراكز الانحناء لمنحني والأخير هو منحني مُبَطِنن(involute)

مطور السطح

evolute of a surface

سطحا المركز بالنسبة للسطح المعطي. (انظر: سطحا المركز بالنسبة لسطح معطي

(surfaces of center relative to a given surface

استخراج

evolution

تعيين جذر كمية مثل إيجاد الجذر التربيعي للعدد 25 . وهي العملية العكسية لعملية إيجاد أس لعدد (involution) .

معادلة تفاضلية تامة

exact differential equation

(differential equation, exact (انظر:

قسمة تامة

exact division

;

قِسمة يساوي الباقي فيها الصفر. ويسمى القاسم في هذه الحالة قاسما تاما.

المركز الخارجي لمثلث

excenter of a triangle

مركز الدائرة الماسة للمثلث من الخارج، وهو نقطة تقاطع منصفي زاويتين خارجيتين للمثلث. وللمثلث ثلاث دوائر تمسه من الخارج.

فائض التسعات

excess of nines

الباقي عند قسمة أي عدد صحيح موجب على تسعة وهو يساوي الباقي عند قسمة مجموع الأرقام المكونة للعدد على 9 . فمثلا فائض التسعات في العدد 237 هو 3 .

الفائض الكروى

excess, spherical

(spherical (spherical)

الدائرة الماسة لمثلث من الخارج

excircle of a triangle = escribed circle of a triangle

(escribed circle of a triangle)

قانون حذف الوسط = قانون التناقض

excluded middle, law of = contradiction, law of

(contradiction, law of :انظر)

طريقة الاستنفاد

exhaustion, method of

طريقة لتعيين المساحات (مثل مساحات الدائرة والقطع الناقص ومقاطع القطع المكافئ) و الحجوم (مثل الهرم والمخروط). ويرجح أن واضع هذه الطريقة هو "يودكسس". وتتلخص هذه الطريقة فيما يتعلق بالمساحات في إيجاد متتابعة تزايدية (أو تناقصية) من مساحات الأشكال المعروفة الأقل من (أو الأكبر من) المساحة المطلوب حسابها ثم إثبات أن هذه المتتابعة تؤول إلى المساحة المطلوبة بسبب استنفاد المنطقة المحصورة بين حد المساحة المطلوبة وحدود المساحات المقابة به لها.

نظرية الوجود

existence theorem

نظرية رياضية تؤكد وجود عنصر واحد على الأقل من نوع معين، مثل النظرية التي تنص على وجود حل لمجموعة معادلات جبرية خطية غير متجانسة عددها n في n من المجاهيل إذا كان محدد المعاملات لا يساوي صفرا.

صيغة المفكوك لعدد

expanded form (notation) of a number

تمثیل العدد في شكل مفكوك، فمثلاً العدد 537.2 في التمثیل العَشري يمكنت كتابته على شكل المفكوك $\frac{1}{10} \times 2 + 1 \times 7 + 10 \times 6 \times 10^2$.

مفكوك

expansion

تمثيل كمية على شكل مجموع من الحدود أو حاصل ضرب ممتد أو، بصفــــة عامة، في صورة مفكوكة أو ممتدة. ويطلق المصطلح أيضا على عملية إيجــاد هذا التمثيل، مثال ذلك مفكوك "تيلور" ومفكوك "فورييه".

مفكوك ذات الحدين

expansion, binomial

(binomial expansion : انظر)

معامل التمدد الطولى

expansion, coefficient of linear

(coefficient of linear expansion : انظر)

معامل التمدد الحرارى

expansion, coefficient of thermal

(coefficient of thermal expansion) انظر:

معامل التمدد الحجمي

expansion, coefficient of volume

(coefficient of volume expansion : انظر)

· مفكوك المحدّد

expansion of a determinant

(determinant انظر: محدّد

فك (دالة) في صورة متسلسلة

expansion (of a function) in a series

كتابة متسلسلة متقاربة للدالة، وتسمى المتسلسلة مفكوكا للدالة.

التوقع الرياضي = القيمة المتوقعة

expectation, mathematical = expected value

القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي x يأخذ قيما x_1,x_2,\ldots باحتمالات p_1,p_2,\ldots على الترتيب هي

 $\sum p_n x_n$

شريطة التقارب المطلق لهذه المتسلسلة إذا كانت لا نهائية.

زاويتان مترافقتان

explementary angles = conjugate angles

زاويتان مجموعهما °360

دالة صريحة

explicit function

دالة ذات تعريف مباشر مثل $f(x) = x^2 + 5$ ، وذلك على العكس مـــن الدالــة الضمنية.

(implicit function انظر: دالة ضمنية)

اس

exponent

رقم يوضع إلى اليمين أعلى الرمز. فمثلا في التعبير "x الرمــز هـو x والأس هو n . إذا كان الأس عددا صحيحاً موجبا n أكبر من واحد فـــإن " $x^1 = x$ ، يعني حاصل ضرب x في نفسه x من المرات ، $x^1 = x$ ، ويعرف x بأنه الواحد إذا كانت x عددا غير صفري.


المنحني الآسي

exponential curve

منحنى الدالة

 $y = a^x$

حيث a>0. و محور السينات هو خط تقربي للمنحني، والمنحني يقطع محور الصادات في النقطة (0,1) كما في الشكل.



معادلة أسية

exponential equation

(equation انظر: معادلة)

 $\sin x, \cos x$ الصيغ الأسية للدالتين

exponential expressions of $\sin x$ and $\cos x$

الصبغتان

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

 $i^2 = -1$ حيث

دالة أسية

exponential function

(function, exponential: انظر)

المتسلسلة الأسية

exponential series

المتسلسلة

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

وهي مفكوك " مكلورين " للدالة e^x وتؤول المتسلسلة إلى هذه الدالة لكل قيم x الحقيقية.

نظرية القيمة المتوسطة المعممة = النظرية الثانية للقيمة المتوسطة

extended mean value theorem = second mean value theorem (انظر: نظريتا القيمة المتوسطة للمشتقات)

(mean value theorems for derivatives

نظام الأعداد الحقيقية الممتد

extended real number system

نظام الأعداد الحقيقية مضافا إلى ∞± .

امتداد جبرى

extension, algebraic

الامتداد الجبري لحقل F هو امتداد تحقق كل عناصره معادلات كثيرات حدود معاملاتها تنتمي إلى F .

امتداد منته

extension, finite

امتداد محدود الدرجة.

امتداد طبيعي

extension, normal

يكون الحقل F^* امتداداً طبيعياً للحقل F إذا كانت له أي من الخصائص المتكافئة الآتية:

a(x)=x هو فئة كل عناصر F التي تحقق a(x)=x الكل التشاكلات الذاتية a التي تحقق a التي تحقق a الله الذاتية a . F

F هو حقل جالوا لكثيرة حدود ذات معاملات تنتمي إلى F . F إذا كانت P كثيرة حدود غير قابلة للاختزال ذات معاملات في F ولها صفر في F ، فإن كل أصفار P تقع في F . F (انظر: امتداد قابل للفصل لحقل F separable extension of a field)

امتداد حقل

extension of a field

كل حقل F^* يحتوي على حقل F هو امتداد للحقال F . ودرجة (degree) الامتداد هي بعد F^* كفراغ اتجاهي أعداده القياسية تنتمي إلى F . F

امتداد بسيط

extension, simple

یکون الحقل f^* امتدادا بسیطاً للحقل F اِذَا احتوی f^* علی عنصر f^* علی عنصر f^* بحیث یکون f^* هو فئهٔ خوارج القسمه f^* ، حیث عنصر f^* میرتا حدود بمعاملات تنتمی إلی f^* ، f^* و یکون f^* و یکون f^*

ويكون p,q كثيرتا حدود بمعاملات تتتمي إلى p,q ، p,q الامتداد البسيط امتدادا منتهيا إذا، وفقط إذا، كان العنصر c عنصرا جبريا بالنسبة إلى F .

زاوية خارجية لمضلع

exterior angle of a polygon

angle of a polygon, exterior (انظر:

زاوية خارجية لمثلث

exterior angle of a triangle

زاوية بين أحد أضلاع المثلث وامتداد ضلع مجاور له. وللمثلث ســـت زوايـــا خارجية.

زوايا خارجية تبادلية

exterior angles, alternate

(angles made by a transversal (انظر: زوایا مصنوعة بقاطع

محتوى خارجي

exterior content

(content of a set of points انظر: محتوى فئة من النقط

زوايا خارجية ـ داخلية

exterior-interior angles

(angles made by a transversal انظر: زوایا مصنوعة بقاطع)

قیاس خارجی

exterior measure

(measure انظر: قياس

خارجية فئة

exterior of a set

فئة العناصر التي لها جوارات لا تتقاطع مع الفئة.

خارجية منحنى بسيط مغلق

exterior of a simple closed curve

أنظر: نظرية منحنى جوردان Jordan curve theorem

نقطة خارجية (نقطة من الخارج)

exterior point

(انظر: زوايا مصنوعة بقاطع angles made by a transversal

دائرتان متماستان من الخارج

externally tangent circles

(انظر: دوائر متماسة tangent circles

عملية خارجية

external operation

(idu: عملية operation)

نسبة خارجية

external ratio

(division, point of انظر: نقطة تقسيم

مماس خارجى لدائرتين = مماس مشترك لدائرتين

external tangent of two circles = common tangent of two circles (انظر: common tangent of two circles)

تعیین جذر عدد

extraction of a root of a number

يستخدم التعبير عادة لتعيين الجذر الحقيقي الموجب للعدد إذا كان العدد موجب والجذر الحقيقي السالب للعدد إذا كان العدد سالبا وكانت رتبة الجذر فردية. فمثلا الجذر التربيعي للعد 9 هو 3 والجذر التكعيبي للعدد 8- هو 2- .

جذر زائد

extraneous root

عدد ينتج عند عملية الحصول على جذور معادلة، وهـو ليـس جـذرا لـهذه المعادلة فمثلا للمعادلة $\frac{x^2-3x+2}{x-2}=0$ جذر وحيد هو الواحد ولكن عند ضرب طرفي هذه المعادلة في (x-2) يظهر جذر جديد هـو 2 وهـو

استكمال خارجي

extrapolation

تقييم أو إجراء حساب تقريبي لقيمة دالة أو كمية لقيم المتغير المستقل أكبر من أو أصغر من جميع قيمه المستخدمة في التقييم أو الحساب فمنسلا، باستخدام قيمتي

log 2, log 3.1) يمكن حساب قيمة تقريبية للكمية (3.1) الستكمال الخارجي من القانون

.
$$\log(3.1) = \log 3 + \frac{1}{10} (\log 3 - \log 2)$$

($interpolation$)

قيمة متطرفة لدالة

extreme or extremum of a function

قيمة عظمي أو قيمة صغري لدالة ما.

(انظر: قيمة عظمي لدالة " maximum of a function ، قيمة عظمي محليـــة maximum value of a function, قيمة عظمي مطلقــة , maximum value of a function (absolute

طركفا نسبة

extremes in a proportion

(proportion انظر: نسبة)

		•		
			•	
			•	

F

وجه

face

(pyramid ، هرم angle ، منشور prism ، هرم

عامل

factor

أحد الأعداد أو العبارات التي ينقسم إليها مقدار ما. مثال ذلك 2 هو أحد عوامل $x^2 + 3x + 2$ هو أحد عوامل x + 1 ، 6

التحليل بالعوامل (في الإحصاء)

factor analysis (in Statistics)

فرع من التحليل متعدد المتغيرات يفترض انه يمكن تمثيل المتغيرات العشوائية المشاهدة $X_i = 1,2,...,n$ ، $X_i = 1,2,...,n$ المساهدة الحرى على الصورة

$$X_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} U_j + b_i e_i$$

حيث n > m . والمتغيرات العشوائية $(U_{_I})$ هـــي عوامــل المتغـيرات $\{e_i\}$ ، بينما $\{e_i\}$ هي حدود الخطأ .

عامل التكامل (في المعادلات التفاضلية)

factor, integrating (in Differential Equations)

عامل إذا ضرب في معادلة تفاضلية طرفها الأيمن صفر، يجعل الطرف الأيسر تفاضلاً تاما (أو مشتقة لدالة). مثال ذلك: المعادلة التفاضلية

$$\frac{1}{x}dy + \frac{y}{x^2}dx = 0$$

d(xy)=0 أو xdy+ydx=0 أو x^2 تصبح x^2 أو xy=const . xy=const

عامل منفرد

factor, monomial

(idu: monomial factor (lidu:

نظرية العوامل

factor theorem

نظرية مفادها أنه إذا ساوت كثيرة حدود الصفر عند تعويض x=a فيها، فإنها تقبل القسمة على (x-a). وعكس هذه النظرية صحيح أيضا: إذا قبلت كثيرة الحدود القسمة على (x-a)، فإنها تساوي الصفر عند تعويض x=a

(remainder theorem (انظر: نظرية الباقي

قابل للتحليل

factorable

١- في الحساب: صفة تعنى احتواء العدد على عوامل (أعداد صحيحة) غير العدد ذاته والواحد الصحيح.

٢- في الجبر : صفة تعنى احتواء كثيرة الحدود على عوامل جبرية غير
 كثيرة الحدود ذاتها والعوامل الثابتة.

مثال ذلك : $y^2 - y^2$ قابلة للتحليل في مجال الأعداد الحقيقية في حين أن $x^2 - y^2$ غير قابلة للتحليل في هذا المجال.

مضروب

factorial

مضروب عدد صحيح موجب n هو حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة الموجبة التي تساوي أو تقل عن n ، ويرمز له بالرمز n! ، ومن ثم فإن $1 \times 2 \times \dots \times 2 \times 1 = n$ أي أن $1 \times 2 \times 2 \times 1 = 2 \times 1 = 1$ ويؤخذ مضروب الصفر مساويا الواحد الصحيح كتعريف.

متسلسلة المضروبات

factorial series

(series, factorial : انظر)

نظرية التحليل الوحيد إلى عوامل

factorization theorem, unique-

النظرية الأساسية في الحساب أو أي من النظريات المماثلة للنطق الصحيحة (integral domains) مثل كثيرات الحدود.

(انظر: نطاق صحيح domain, integral ، كثيرة حدود غير قابلة للاختزال (irreducible polynomial

طريقة الوضع الخطأ

falsi position, method of = regula falsi

طريقة لحساب القيم التقريبية لجذور معادلة جبرية. تتضمن الطريقة البدء بقيمة r قريبة نسبيا من قيمة الجذر ثم التعويض عن المتغير بالقيمة (r+h) في المعادلة وإهمال قوي h الأعلى من الواحد (لكونها صغيرة نسبيا).

عائلة منحنيات أو سطوح ذات n بارامتر

family of curves or surfaces of n-parameters

عائلة منحنيات أو سطوح يتم الحصول عليها من معادلة معلومة بإعطاء عدد n من الثوابت الأساسية المتضمنة في المعادلة قيما مختلفة.

متتابعة "فاري"

Farey sequence

متتابعة "فاري" من رتبة n هي المتتابعة المتزايدة لجميع الكسور $\frac{p}{q}$ ،

عددان صحیحان لیس لهما عامل $(q \le n \,,\, 0 \le \frac{p}{q} \le 1)$ p,q حیث

مشترك بخلاف الواحد. مثلاً، متتابعة فاري من الرتبة الخامسة هي مشترك بخلاف الواحد. $\frac{0}{1}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{$

إذا كانت $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}$ ثلاثة حدود متتالية في متتابعة فاري ، فإن

فاري" هذه الحقائق بدون برهان سنة $\frac{c}{d} = \frac{a+e}{b+f}$, bc-ad=1 (Haros) وأثبتها "كوشي" في وقت لاحق. ولكن ظهر أن "هاروس" (كان قد أعطى هذه الحقائق نفسها و أثبتها سنة 1802.

نظرية "فاتو"

Fatou's theorem (or lemma)

 $\lim \sup \int_{E} f_n d\mu \le \int_{E} (\limsup f_n) d\mu$

g ، $gd\mu \neq -\infty$ ، إذا وجدت دالة g قابلة للقياس وكان g

تنسب النظرية إلى عالم الرياضيات الفرنسي "بييرفاتو" (P. Fatou, 1929) .

نظرية "فيرما" الأخيرة

Fermat's last theorem

نظرية تنص على أن المعادلة

 $x^n + y^n = z^n$

حيث n عدد صحيح أكبر من 2، ليس لها حلول من الأعداد الصحيحة الموجبة. وقد تم إثبات النظرية بعد أكثر من 300 سنة منذ وفاة واضعها (1665) برغم إثباتها من قبل في حالات خاصة.

أعداد "فيرما"

Fermat's numbers

الأعداد F_n على الصورة

 $F_n = 2^{2^n} + 1$

حيث n=1,2,3,4,... وكان " فيرما " يعتقد أن هذه الأعداد قد تكون كلها أولية والواقع أن F_5 ليس عددا أوليا:

 $F_5 = (641)(6,700,417) = 4,294,967,297$

يمكن رسم مضلع منتظم عدد أضلاعه p ، حيث p عدد أولي باستخدام المسطرة والفرجار إذا، وفقط إذا، كان p أحد أعداد فيرما.

تنسب هذه النظرية إلى العالم الفرنسي "بيير فيرما" (P. Fermat, 1665) .

مبدأ "فيرما"

Fermat's principle

قاعدة تنص على أن شعاع الضوء يستغرق وقتا في مساره الفعلي أقلل من الوقت الذي قد يستغرقه في أي مسار آخر له نفس نقطتي البداية والنهاية. وقد استخدم "جون برنوللي" هذه القاعدة في حل مسألة البراكستوكرون. (انظر: مسألة المسار الأقصر زمنا brachistochrone problem)

حلزون "فيرما" = حلزون مكافئ

Fermat's spiral = parabolic spiral

(idu: انظر: parabolic spiral)

نظرية "فيرما" (في نظرية الأعداد)

Fermat's theorem (in Number Theory)

إذا كان العددان a, p موجبين وكان العدد p أوليا وكان العدد a أوليا بالنسبة إلى p ، فإن باقي قسمة a^{p-1} على p يكون الواحد الصحيح، أي أن a=2, p=5 ، حيث $a^{p-1}=1$, a=2, $a^{p-1}=1$, a=2, a=2,

حل "فِراري" (أو "فرارو") للمعادلة الجبرية من الدرجة الرابعة Ferrari's (or Ferraro's) solution of the quartic

حل المعادلة

 $x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ بالبر هنة على أن جذور ها هي أيضاً جذور المعادلتين $x^2 + (1/2)px + k = \pm (ax + b)$

حيث $a = (2k + \frac{1}{4}p^2 - q)^{1/2}$, $b = \frac{(kp - r)}{(2a)}$ حيث الدرجة الثالثة

. $k^3 - \frac{1}{2}qk^2 + \frac{1}{4}(pr - 4s)k + \frac{1}{8}(4qs - p^2s - r^2) = 0$. (L. Ferraro, 1565) ("فرارو") فراري" (أو "فرارو")

متتابعة "فيبوناتشي"

Fibonacci sequence

منتابعة الأعداد ...,1,2,3,5,8,13,21 وكل حد فيها بعد الثآني هو مجموع الحدين السابقين له. وتسمي هذه الأعداد أعداد "فيبوناتشي" (ليوناردو فيبوناتش ويسمي أيضا ليوناردو البيزوي نسبة إلى مدينة بيزا بإيطاليا (1250)).

حقل

field

فئة تعرف عليها عمليتا جمع وضرب لهما الصفات التالية:

١- الفئة هي زمرة إبدالية بالنسبة لعملية الجمع.

٢- عملية الضرب إبدالية والفئة بعد حذف العنصر الصفري (صفر) لزمرة
 الجمع هي زمرة عمليتها هي عملية الضرب.

a,b الأي ثلاثة عناصر a(b+c)=ab+ac المتساوية a(b+c)=ab+ac من الفئة.

مميّز حقل

field, characteristic of a

(characteristic of a ring or a field انظر: مميّز حلقة أو حقل

حقل مرتب تام

field, complete ordered

يكون الحقل المرتب تاما إذا وجد حد أعلى أصغر لكل من فئاته الجزئية غير الخالية التي لها حد أعلى (upper bound) . الأعداد الحقيقية تُكُون حقلاً مرتباً تاماً.

امتداد حقل

field, extension of

(extension of a field: انظر)

حقل "جالوا"

field, Galois

(Galois field : انظر)

حقل أعداد

field, number

كل فئة من الأعداد الحقيقية أو الأعداد المركبة ينتمي إليها مجموع كل عنصرين منها والفرق بينهما وحاصل ضربهما وخرج قسمة أحدهما على الآخر (إلا على الصفر).

مجال قوة

field of force

(force, field of: انظر)

مجال الدراسة

field of study

مجموعة من الموضوعات تعالج موادا ترتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، مثل مجال التحليل أو مجال الرياضيات البحتة أو مجال الرياضيات التطبيقية.

حقل مرتب

field, ordered

حقل يحتوي على فئة من العناصر الموجبة تحقق الشرطين التاليين: ١- ناتج جمع وحاصل ضرب كل عنصرين موجبين يكون موجبا. ٢- لكل عنصر x في الحقل يتحقق احتمال واحد فقط من الاحتمالات الآتية:

a)
$$x > 0$$
 b) $x = 0$ c) $-x > 0$

حقل مثالي

field, perfect

إذا انتمت معاملات كثيرة حدود غير قابلة للاختزال لحقل ما فإن هذا الحقل يكون مثاليا إذا لم يكن لكثيرات الحدود هذه جذور مكررة.

خطة ميدانية (في الإحصاء)

field plan (in Statistics)

عند إجراء تجارب لتحديد تأثير عامل معين من بين عوامل مختلفة على ظاهرة ما، تُحدد الخطة الميدانية الترتيب المكاني لإجراء هذه التجارب بحيث يُثبَّت تأثير العوامل الأخرى (غير العامل المطلوب تحديد تأثيره) عند مواضع إجراء هذه التجارب.

حقل ممتدات

field, tensor

(tensor ممتد)

شكل

figure

۱- علامة أو رمز يدل على عدد مثل 1,5,12 ويستعمل أحيانا بمعني رقم (digit).

r - رسم أو مخطط يستخدم للمساعدة في تقديم أو شرح موضوع في الكتب أو نشرات البحوث المنشورة.

شكل هندسي

figure, geometric

(geometric figure : انظر)

شكل مستو

figure, plane

(انظر: مستوي plane)

مرشتح

filter

المرشّح هو فصيلة F من الفئات الجزئية غير الخالية لفئة x ينتمي تقاطع أي عنصرين فيها إلى F وبحيث تنتمي أي فئة جزئية من x تحتوي على أحد عناصر F أيضاً إلى F.

دقة تقسيم

fineness of partition

(انظر: تجزيء فترة partition of an interval ، تجزيء فئة partition of a set)

طابع محدود

finite character

(character, finite : انظر)

كسر عشرى منته

finite decimal

(decimal number system انظر: نظام الأعداد العَشرية

فروق محدودة

finite differences

(differences, finite : انظر)

عدم اتصال محدود

finite discontinuity

(discontinuity, finite انظر: انفصال)

امتداد محدود لحقل

finite extension of field

(extension of field انظر: امتداد حقل)

فصيلة من فئات محدودة محلياً

finite family of sets, locally

تكون فصيلة الفئات الجزئية لفراغ طوبولوجى T محدودة محليًا إذا كان لكل نقطة في T جوار يقطع عددا محدودا فقط من هذه الفئات الجزئية.

خاصية التقاطع المحدود

finite intersection property

خاصية لمجموعة من الفئات تعني أن كل مجموعة جزئية غير خالية من هذه الفئات لها فئة تقاطع غير خالية.

كمية محدودة

finite quantity

1- كمية لها حد أعلى. فمثلا الدالة تكون محدودة على فترة إذا كان لها حدد أعلى على الفترة، ومع ذلك يقال أيضا إن الدالة محدودة على فئه إذا كانت جميع قيمها محدودة (أي أن هذه القيم لا تتضمن $\infty+$ أو $\infty-$) وعلى ذلك فالدالة $\frac{1}{x}$ محدودة ولكن ليس لها حد أعلى لكل x>0.

Y - يقال للعدد الحقيقي (أو المركب) إنه محدود لتمييزه عن الأعداد المثالية ∞ - . ∞ .

فئة محدودة

finite set

فئة تحتوي على عدد محدد من العناصر. مثال ذلك تكون الأعداد الصحيحة الواقعة بين 0 و 100 فئة محدودة.

حرف " z " لفيشر

Fisher's z

التحويل

$$z(r) = \frac{1}{2} \log_e \frac{1+r}{1-r} = \tanh^{-1} r$$

حيث r معامل الارتباط وإذا كانت العينات العشوائية ماخوذة من مجتمع طبيعي ثنائي التغير فإن توزيع z'' يقترب من الصورة الطبيعية أسرع من معامل الارتباط نفسه. ومتوسط z'' يساوي القيمة ρ تقريبا حيث ρ معامل الارتباط للمجتمع وإذا كان حجم العينات ρ كبيرا بدرجة كافية ، فإن تباين z يساوي $\frac{1}{n-3}$ تقريبا. ينسب الاصطلاح إلى عالم الإحصاء والوراثة البريطاني "رونالد إلمر فيشر" (R. A. Fischer, 1962).

توزيع " z " لفيشر

Fisher's z distribution

هو التوزيع

$$z = \frac{1}{2} \log \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

حيث s_1^2 , s_2^2 تقدير ان مستقلان من عينات عشو ائية لتغاير مجتمع طبيعي.

توفيق (ضبط) المنحنيات

fitting, curve

(انظر: منحني تجريبي empirical curve ، طريقة المربعات الصغرى least squares, method of)

نقطة ثابتة

fixed point

x=3 نقطة لا يتغير موضعها تحت تأثير تحويل ما أو راسم ما. مثال ذلك s(x)=4x-9 نقطة ثابتة للتحويل s(x)=4x-9 .

نظريات النقطة الثابتة

fixed point theorems

نظريات تتناول وجود نقط ثابتة للتحويلات بشروط معينة ، ومنها نظرية النقطة الثابتة لبروور. النقطة الثابتة لبروور. (انظر: نظرية النقطة الثابتة لـــ" بوانكاريه وبيركوف "

(fixed point theorem, Poincaré-Birkhoff

قيمة ثابتة لكمية ما

fixed value of quantity

قيمة لا تتغير لكمية خلال عملية أو مجموعة من العمليات.

زاوية مستقيمة

flat angle = straight angle

زاوية قياسها °180.

نقطة انقلاب وتفرع

flecnode

نقطة تفرع للمنحني ونقطة انقلاب لأحد فرعي المنحني المتماسين عندها.

معدل تغير المكيل

flexion

مصطلح يستخدم أحياناً للدلالة على معدل تغير ميل منحني، أي على المشتقة الثانية لدالة المنحني.

العلامة العشرية العائمة

floating decimal point

مصطلح يستخدم في العمليات الحسابية للدلالة على أن العلامة العَشرية لا تكون ثابتة ويحدد الحاسب موضعها في كل عملية.

مخطط المسار

flow chart

(chart انظر : مخطط)

تراوح

fluctuation

تغير مقدار كمية بالزيادة أو النقص عن قيمة متوسطة.

ميكانيكا الموائع

fluids, mechanics of

(mechanics الميكانيكا) (mechanics

وتر بؤري لقطع مخروطي

focal chord of a conic

وتر للقطع المخروطي يمر ببؤرته.

نقطة بؤرية (في حساب التغيرات)

focal point (in the Calculus of Variations)

النقطة البؤرية لمنحني C والواقعة على المستعرض T هي نقطة تماس مع غلاف مستعرضات T.

الخاصية البؤرية للقطوع المخروطية

focal property of conics

(conics, focal property of : انظر)

نصف القطر البؤري

focal radius

القطعة المستقيمة التي تصل بين بؤرة قطع مخروطي ونقطة عليه.

بؤرة

focus

(conic sections انظر : القطوع المخروطية

فوليوم "ديكارت"

folium of Descartes

منحني مستو تكعيبي يتكون من عروة واحدة وعقدة وفر عين كلاهما تقربي لخط مستقيم واحد. ومعادلة هذا المنحني في نظام الإحداثيات الديكارتية هي $x^3 + y^3 = 3axy$

x+y+a=0 حيث a ثابت. يمر المنحني بنقطة الأصل كما أن المستقيم خط تقربي له.

۱ – قدم

foot

وحدة قياس للطول في النظام البريطاني للوحدات.

۲- موقع

نقطة تقاطع مستقيم مع مستقيم آخر أو مع مستوي. والحالة الخاصة الهامة هي عندما يكون المستقيم عموديا على المستقيم الآخر أو على المستوي.

قدم باوند

foot-pound

وحدة للشغل في النظام البريطاني للوحدات.

قوة

force

كل مؤثر يدفع جسم أو يجذبه أو يضغطه أو يشوهه بأية طريقة من الطرق. والقوة متجه يساوي معدل تغير متجه كمية حركة الجسيم الذي تؤثر فيه القوة بالنسبة للزمن.

(Newton's laws of motion انظر: قوانين نيوتن للحركة)

قوة مركزية طاردة

force, centrifugal

(centrifugal force : انظر)

قوة مركزية جاذبة

force, centripetal

(centripetal force : انظر)

قوة محافظة

force, conservative

(idر: conservative force)

قوة دافعة كهربائية

force, electromotive

(electromotive force :انظر)

مجال قوة

force, field of

الحيز من الفراغ الذي يظهر فيه تأثير القوة.

عزم قوة

force, moment of

(moment of a force

(انظر:

مسقط قوة

force, projection of a

(idر: إسقاط عمودي orthogonal projection)

أنبوب القوة

force, tube of

أنبوب وهمي يرسم سطحه بخطوط القوة.

وحدة القوة

force, unit of

القوة التي تكسب وحدة الكتل عجلة مقدارها الوحدة. ووحدة القوة في النظام النطام الدولي للوحدات هي النيوتن وهي القوة التي تكسب كتلة مقدارها كيلو جرام واحد عجلة مقدارها $1m/\sec^2$. وفي النظام المتري للوحدات هي الداين وهي القوة التي تكسب كتلة مقدارها جرام واحد عجلة مقدارها $1cm/\sec^2$.

متجه القوة

force vector

متجه طوله يمثل مقدار القوة واتجاهه يوازي اتجاهها.

(انظر: متوازي أضلاع القوي parallelogram of forces (انظر)

ذبذبات قسرية

forced oscillations and vibrations

الذبذبات التي تنشأ في نظام ميكانيكي عند تأثير قوة خارجية فيه، إضافة إلى القوى المسببة للذبذبات الحرة في هذا النظام.

متوازى أضلاع القوى

forces, parallelogram of

(parallelogram of forces:انظر)

صورة

form

۱- تعبير رياضي من نوع معين (standard form of an equation) انظر: الصورة القياسية لمعادلة ٢- كثيرة حدود متجانسة في متغيرين أو أكثر. وعلى الخصوص الصورة

الثنائية الخطية p(x,y) وهي كثيرة حدود من الدرجة الثانية متجانسة من الدرجة الأولي في المتغيرات x_1, x_2, \dots, x_n وكذلك في المتغيرات x_1, y_2, \dots, y_n

$$p(x,y) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j$$

صورة قياسية لمعادلة

form of an equation, standard

(standard form of an equation (انظر :

صيغة تربيعية موجبة قطعا

form, positive definite quadratic

كثيرة حدود من الدرجة الثانية على الصورة

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

 $x_1, x_2, ..., x_n$ القيم الحقيقية غير الصفرية للمتغيرات القيم الحقيقية غير

صيغة تربيعية شبه موجبة

form, positive semi-definite quadratic

صيغة جبرية متجانسة من الدرجة الثانية تكون موجبة أو تساوى الصفر.

متسلسلة قوى شكلية

formal power series

متسلسلة قوي لا يُهتم بتقاربها في العمليات التي تُجري عليها.

صيغة

formula

قاعدة عامة يعبر عنها رياضيا.

مسألة الألوان الأربعة

four-color problem

مسألة تحديد ما إذا كان يمكن تلوين أي خريطة مستوية بأربعة ألوان فقط بحيث لا تلون أي دولتين لهما حدود مشتركة بلون واحد وذلك بفرض أن جميع الدول متصلة، أي أنه يمكن الوصول بين أي نقطتين في الدولة نفسها دون تركها. وقد تم إثبات إمكان المطلوب إذا كان عدد الألوان خمسة كما تصم إثبات استحالة المطلوب إذا كان عدد الألوان ثلاثة.

قاعدة (طريقة) الخطوات الأربع

four-step rule (method)

قاعدة لإيجاد مشتقة دالة f(x) باستخدام الخطوات الأربع التالية:

 $f(x + \Delta x)$ الى x ثم أحصل على Δx الى Δx ثم أحصل على Δx . Δx

 $f(x + \Delta x) - f(x)$ على الدالة لتحصل على - \dot{Y}

 $f(x + \Delta x) - f(x)]/\Delta x$ لتحصل على Δx [$f(x + \Delta x) - f(x)$] ثم اختصر

(مثلا بفك البسط وحذف Δx من كل من البسط والمقام).

 Δx الصفر. Δx من الصفر.

فمثلا إذا كانت $f(x) = x^2$ فإن الخطوات الأربع تعطي:

 $f(x + \Delta x) = (x + \Delta x)^2 - 1$

 $f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 - \forall$

$$[f(x + \Delta x) - f(x)]/\Delta x = [(x + \Delta x)^2 - x^2]/\Delta x = 2x + \Delta x - \nabla$$

$$\lim(2x + \Delta x) = 2x = (d/dx)x^2 - \xi$$

تحويلا جيب التمام والجيب لـ "فورييه"

Fourier cosine, and sine transforms

التحويلان

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{0}^{\infty} g(x) \sin(tx) dt$$
$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{0}^{\infty} g(x) \cos(tx) dt$$

على الترتيب. وكل من هذين التحويلين تعاكسي، أي يمكن تبادل الدالتين f و g فيهما، وفي الأول تكون هاتان الدالتان فرديتين وفي الثاني تكونان زوجيتين.

متسلسلة "فورييه"

Fourier series

متسلسلة على الصورة

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

توجد لها دالة f(x) بحيث

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \ dx \quad , n \ge 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ dx \quad , n \ge 1$$

ينسب الاصطلاح إلى عالم الرياضيات الفرنسي البارون "جوزيف فورييه" (J. Fourier, 1830)

متسلسلة "فورييه" لنصف المدى

Fourier's half-range series

إحدى المتسلسلتين

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx , \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

وتسمي الأولى متسلسلة جيب التمام والأخرى متسلسلة الجيب. وحيث أن جيب التمام دالة زوجية فإن المتسلسلة الأولى لا تمثل دالة في المدى الكامل إلا

إذا كانت هذه الدالة زوجية. وكذلك لا تمثل متسلسلة الجيب دالة فـــي المــدى الكامل إلا إذا كانت هذه الدالة فردية.

نظرية "فورييه"

Fourier's theorem

نظرية تنص على الآتي: إذا كانت f دالة في المتغير الحقيقي x قابلة للتكامل هي والدالة |f| على الفترة $[\pi,\pi]$ ووجدت الدالة f على كل قيم x خارج الفترة $[\pi,\pi]$ بحيث تصبح دالة دورية بدورة مقدار ها 2π ، فإن المتسلسلة

$$\frac{1}{2}a_o + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

حيث

 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \qquad , \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$

تتقارب إلى f(x) إذا كانت f(x) متصلة عند f(x) وتتقارب إلى f(x) أذا كانت f(x) متصلة عند f(x) متصلة عند f(x) متصلة عند f(x) مين اليمين ومن حيث f(x), f(x) نهايتا الدالة f(x) عند f(x) من اليمين ومن اليسار على الترتيب، إذا تحقق شرط واحد على الأقل من الشروط الخمسة الآتية:

f - f محدودة ولها فقط عدد محدود من النهايات العظمى والصغرى وكذا عدد محدود من نقاط عدم الاتصال على الفترة $[-\pi,\pi]$ (شريط "دريشلت").

x - توجد فترة f و x نقطة منتصفها بحیث تکون f محدودة ومطردة علی کل من نصفی الفترة f .

x عليه محدودة التباين (شرط x تكون الدالة x عليه محدودة التباين (شرط "جوردان")

وأيضا عدد موجب δ بحيــث $f(x_{-})$, $f(x_{+})$ عدد موجب δ بحيــث تكون الدالة

$$\left| \frac{f(x+t) - f(x_+)}{t} + \frac{f(x-t) - f(x_-)}{t} \right|$$

قابلة للتكامل على الفترة $[-\delta, \delta]$ (شرط "ديني").

x الدالة f قابلة للاشتقاق من اليمين ومن اليسار عند f

(انظر فراغ "بناخ" Banach space ، نواة "دريشلت" Dirichlet kernel ، نواة "فيير " Feyer's kernel)

- تحویل "فورییه"

Fourier transform

تحویل فورییه للداله
$$g$$
 هو الداله حیث $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{ix} dt$

على أن تحقق الدالة g شروطا كافية لوجود التكامل المتضمن في التعريف.

کسر

fraction

خارج قسمة كمية على أخري ويسمي المقسوم البسط والمقسوم عليه المقام.

کسر مرکّب (معقد)

fraction, complex

كسر بسطه أو مقامه أو كلاهما ليس عددا صحيحاً.

كسر مستمر

fraction, continued

عدد مضاف إليه كسر مقامه عدد مضاف إليه كسر، وهلم جرا، مثل

$$a_{1} + \frac{b_{2}}{a_{2} + \frac{b_{3}}{a_{3} + \frac{b_{4}}{a_{4} + \frac{b_{5}}{a_{5} + \dots}}}}$$

كسر عَشري

fraction, decimal

(decimal إنظر: عَشري)

كسر معتل

fraction, improper

(fraction, proper عسر صحيح)

كسر مستمر غير منته

fraction, nonterminating continued

كسر مستمر عدد حدوده لا نهائي.

كسر صحيح

fraction, proper

يسمى الكسر
$$p = \frac{p}{q}$$
 صحيحا إذا قل البسط $p = q$ عن المقام $p = q$ و إلا كان الكسر معتل (improper) . فمثلا $p = q$ كسر صحيح، بينما $p = q$ كسر معتل.

كسر قياسي

fraction, rational

١- كسر كل من بسطه ومقامه عدد قياسي.
 ٢- كسر كل من بسطه ومقامه كثيرة حدود ويسمي في هذه الحالة أيضا دالة

كسر بسيط

fraction, simple

كسر بسطه ومقامه عددان صحيحان.

كسر مستمر منته

fraction, terminating continued

كسر مستمر له عدد محدود من الحدود مثل الكسور

$$a_1, a_1 + \frac{b_2}{a_2}, a_1 + \frac{b_2}{a_2 + \frac{b_3}{a_3}}, \dots$$

معادلة كسرية

fractional equation

 $\frac{x}{2} + 2x = 1$ معادلة تتضمن كسورا من أي نوع، مثل -1

 $\frac{(x^2+2x+1)}{r^2}=0$ معادلة تتضمن كسورا يظهر المتغير في مقامها مثل - $\frac{(x^2+2x+1)}{r^2}=0$

fractional exponent

أس كسري

(exponent

(انظر: أس

إطار الإسناد

frame of reference

في المستوي: أية مجموعة من المستقيمات أو المنحنيات في مستوي يمكن عن طريقها تحديد موضع أية نقطة فيه. في الفراغ: أية مجموعة من المستويات أو السطوح يمكن عن طريقها تحديد موضع أية نقطة في الفراغ.

فراغ "فريشيه"

Frechet space

(انظر: فراغ طوبولوجي topological space)

المحيدد الأول لـ "فردهولم"

Fredholm minor, first

يعطى المحيدد الأول لــ " فردهولم " $D(x,y;\lambda)$ للنواة $k\left(x,y
ight)$ بمتسلسلة القوي

$$D(x, y; \lambda) = \lambda \kappa(x, y) - \lambda^{2} \int_{a}^{b} \begin{vmatrix} \kappa(x, y) & \kappa(x, t) \\ \kappa(t, y) & \kappa(t, t) \end{vmatrix} dt + \frac{\lambda^{3}}{2} \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} \begin{vmatrix} \kappa(x, y) & \kappa(x, t_{1}) \\ \kappa(t_{1}, y) & \kappa(x, t_{1}) & \kappa(x, t_{2}) \\ \kappa(t_{1}, y) & \kappa(t_{1}, t_{1}) & \kappa(t_{1}, t_{2}) \end{vmatrix} dt_{1} dt_{2} + \dots$$

(Fredholm's integral equations انظر: معادلات فردهولم التكاملية

محدِّد "فردهولم" (في المعادلات التكاملية)

Fredholm's determinant (in Integral Equations)

محدّد "فردهولم" $D(\lambda)$ للنواة k(x,y) هو متسلسلة القوي في:

$$D(\lambda) = 1 - \lambda \int_{a}^{b} k(t, t)dt + \frac{\lambda^{2}}{2!} \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} \begin{vmatrix} k(t_{1}, t_{1}) & k(t_{1}, t_{2}) \\ k(t_{2}, t_{1}) & k(t_{2}, t_{2}) \end{vmatrix} dt_{1}dt_{2} - \frac{\lambda^{3}}{3!} \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} \begin{vmatrix} k(t_{1}, t_{1}) & 0 & k(t_{1}, t_{3}) \\ 0 & 0 & 0 \\ k(t_{3}, t_{1}) & 0 & k(t_{3}, t_{3}) \end{vmatrix} dt_{1}dt_{2}dt_{3} + \dots$$

(Fredholm's integral equations انظر: معادلات فردهولم التكاملية

معادلات " فردهولم " التكاملية

Fredholm's integral equations

1

معادلة فردهولم التكاملية من النوع الأول هي

$$f(x) = \int_{a}^{b} k(x,t)y(t)dt$$

ومن النوع الثاني هي

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_{a}^{b} k(x, t)y(t)dt$$

حيث f, k دالتان معلومتان، y الدالة المجهولة.

تسمي الدالة k نواة المعادلة، وتكون المعادلة من النوع الثاني متجانسة عندما f(x) = 0.

حل معادلة " فردهولم " التكاملية من النوع الثاني

Fredholm solution of Fredholm's integral equation of the second kind

إذا كانت الدالة f(x) متصلة في الفترة $a \le x \le b$ وكانت k(x,t) دالة متصلة في المتغيرين في الفترة $a \le x \le b$ و $a \le x \le b$ وكان المحدد $D(\lambda)$ للنواة k(x,t) لا يساوي الصفر، فإن معادلة " فردهولم " التكاملية من النوع الثاني

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_{a}^{b} k(x, t) y(t) dt$$

لها حل متصل وحيد، هو

$$y(x) = f(x) + \frac{1}{D(\lambda)} \int_{a}^{b} D(x, t; \lambda) f(t) dt$$

حيث $D(x,t;\lambda)$ المحيد الأول للنواة k(x,t) و $D(x,t;\lambda)$ هو محدد فردهولم للنواة.

تنسب المعادلات السابقة وحلولها إلى عالم الرياضيات السويدي "ايريك فردهولم" (E. Fredholm, 1972).

درجات الحرية

freedom, degrees of

I- في الإحصاء: عدد المتغيرات الحرة الداخلة في الإحصاء. الذا كان التوزيع الإحصائي لعدد n من المتغيرات يعتمد فعلا على n-p من هذه المتغيرات (وليس أقل من ذلك)، فإنه يوجد n-p من درجات الحرية. ويسمي العدد p بعدد القيود على توزيع p من المتغيرات . T- في الميكانيكا : عدد الإحداثيات المستقلة اللازمة لتعيين موضع جسم في الفراغ.

زُمرة حرة

free group

زُمرة لها فئة من المولدات (generators) حاصل ضرب أي عدد منها في أي عدد من معكوساتها لا يساوي العنصر المحايد إلا إذا أمكن كتابة المضروب على الصورة aa^{-1} .

صيغ "فرينيه وسيريه"

Frenet-Serret formulae

الصيغ

$$\frac{d\alpha}{ds} = \frac{\beta}{\rho} \ , \ \frac{d\beta}{ds} = -\frac{\alpha}{\rho} - \frac{\gamma}{\tau} \quad , \quad \frac{d\gamma}{ds} = \frac{\beta}{\tau}$$

حيث s طول القوس لمنحني فراغي و γ,β,α متجهات الوحدة في التجاهات المماس والعمودي والعمود الثاني (عمود اللثام) على السترتيب و τ,ρ نصفا قطر الانحناء واللي (torsion) للمنحني.

تكرار (في الإحصاء)

frequency (in Statistics)

عدد العناصر التي تنتمي إلى فصيلة معينة من مجموعة من البيانات.

التكرار المطلق (في الإحصاء)

frequency, absolute (in Statistics)

إذا ڤسِّمت مجموعة من البيانات إلى فصائل مختلفة، يكُون التكرار ُالْمطلَقُ فَى ُ فصيلة معينة هو عدد عناصر هذه الفصيلة.

منحنى التكرار (في الإحصاء)

frequency curve or diagram (in Statistics)

الصورة البيانية (graphical picture) لمجموعة من التكرارات لقيم مختلفة لمتغير، وفي هذا المنحنى يمثل الإحداثي الرأسي (ordinate) تكرار المتغير، وتمثل المساحة تحت المنحنى التكرار الكلى ويُعطي التكرار النسبي لفترة ما بنسبة المساحة تحت المنحنى لهذه الفترة إلى المساحة الكلية.

داله التكرار (في الإحصاء)

frequency function (in Statistics)

دالة التكرار المطلق لمتغير x ذي قيم عددها محدود (أو لا نهائية قابلة للعد) هي الدالة f التي يكون لها $f(x_i)$ هو التكرار المطلق للمتغير x أما دالة التكرار النسبي فهي الدالة y التي يكون لها $y(x_i)$ هو التكرار النسبي للمتغير $y(x_i)$ ولمتغير عشوائي ذي قيم محتملة $y(x_i)$ ، تكون دالة التكرار هي الدالة $y(x_i)$ ، تكون دالة التكرار هي الدالة $y(x_i)$ ، ويطلق على الدالة في هذه الحالة أحيانا مصطلح دالة الاحتمال .

التكرار النسبى (في الإحصاء)

frequency, relative (in Statistics)

نسبة التكرار المطلق إلى العدد الكلى للبيانات.

تكاملا "فرينل"

Fresnel integrals

لهذا المصطلح تعريفان ١- التكاملان

$$\int_{0}^{x} \sin x^{2} dx , \int_{0}^{x} \cos x^{2} dx$$

ويساويان

$$\int_{0}^{x} \cos x^{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{x^{5}}{5 \cdot 2!} + \frac{x^{11}}{9 \cdot 4!} - \cdots$$

$$\int_{0}^{x} \sin x^{2} dx = \frac{x^{3}}{3} - \frac{x^{7}}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \cdots$$

ويتقارب هذان التكاملان لجميع قيم x. ويسمي الأولْ تكامل الجيب لـــ "فرينل" والثاني تكامل جيب التمام لــ "فرينل".

٢- التكاملان

$$\int_{x}^{\infty} \frac{\cos t}{t^{1/2}} dt = U \cos x - V \sin x$$

$$\int_{x}^{\infty} \frac{\sin t}{t^{1/2}} dt = U \sin x - V \cos x$$

حيث

زاوية الاحتكاك

friction, angle of

(friction, force of انظر: قوة الاحتكاك)

معامل الاحتكاك

friction, coefficient of

(friction, force of انظر: قوة الاحتكاك)

قوة الاحتكاك

friction, force of

إذا تلامس جسمان ساكنان فإن القوي الخارجية المؤثرة في إحداهما تتوازن مع قوة رد فعل الجسم الآخر عليه وتسمي الأخيرة قوة رد الفعل المحصل ولها مركبتان، إحداهما (N) عمودية على مستوي التماس وتسمي قصوة رد الفعل

العمودي (normal reaction) والأخرى (F) واقعة في مستوى التماس وتسمي قوة الاحتكاك. وعندما يكون أي من الجسمين علي وشك الحركة منزلقاً على الآخر فإن اتجاه قوة الاحتكاك يضاد اتجاه الحركة المحتملة. أمـــا الزاوية الحادة α بين رد الفعل المحصل ورد الفعل العمودي فتسمي زاوية الاحتكاك (angle of friction) ويعطى ظلها بالعلاقة

 $\tan\alpha = \frac{|F|}{|N|}$

ويسمى هذا الظل معامل الاحتكاك بين مادتى الجسمين.

نظرية "فروبنيوس"

Frobenius' theorem

نظریة تنص علی أنه إذا كان D جَبْر قسمة (division algebra) على حقل الأعداد الحقيقية وكان كل عنصر من عناصر D يحقق معادلة كثيرة حدود معاملاتها حقیقیة، فإن D یکون متشاکلاً لحقل الأعداد الحقیقیة، ولحقل الأعداد المركبة أو لجبر قسمة الرباعيات

(division algebra of quaternions) ويمكن تعميم النظرية إذا اختصــرت القيود على D بحذف الفرض بأن عملية الضــرب إدماجيــة. وتكــون الإمكانية الإضافية الوحيدة للجبر D هي جبر "كايلي" (Cayley algebra)

(Cayley algebra "كايلي" جبر "كايلي")

frontier of a set

(interior of a set انظر: داخلية فئة

مجستم ناقص

حد الفئة

frustum of a solid

جزء المجسَّم المحصور بين مستويين متوازيين يقطعانه. (ide مخروط pyramid ، مخروط (cone

F فئة

F set

(انظر: فئة " بوريل " Borel set)

نقطة ارتكاز

fulcrum

النقطة التي ترتكز عليها رافعة . (انظر: رافعة lever)

دالة (راسم)

function

ارتباط عنصر واحد من فئة معينة (المدى) بعنصر واحد من فئة أخرى (النطاق) فمثلاً يمكن القول أن عمر شخص ما هو دالة لهذا الشخص وإن نطاق هذه الدالة هي فئة جميع البشر والمدى لها هو فئة جميع الأعداد الحقيقية التي هي أعمار الأشخاص الأحياء حالياً. ومساحة الدائرة دالة في نصف قطرها وجيب الزاوية دالة في الزاوية. وأيضا العبارة $y = 3x^2 + 7$ تعرف $y = 3x^2 + 7$ عندما ينص على أن النطاق (مثلاً) هو فئة تعرف y = 7 كدالة في هذه الحالة توجد قيمة للمتغير y = 7 ترتبط بكل قيمة حقيقية للعدد x = 7 ومدى هذه الدالة هو فئة جميع الأعداد الحقيقية التي لا تقل عن y = 7 ويسمى y = 7 المتغير المستقل، y = 7 المتغير المستقل، y = 7 فإن قيمة y = 7 كتبت المعادلة y = 7 على الصورة y = 7 فإن قيمة y = 7 عندما y = 7

دالة جبرية

function, algebraic

دالة يمكن الحصول عليها بعمليات جبرية فقط.

دالة تحليلية

function, analytic

(analytic function :انظر)

دالة ذاتية التشاكل

function, automorphic

(automorphic function : انظر)

دالة مميّزة

function, characteristic

(characteristic function : انظر)

دالة متممة

function, complementary

(انظر: المعادلة التفاضلية الخطية العامة

(differential equations, general linear

دالة تحصيلية

function, composite

(idd(: دالة محصلة في متغير واحد composite function of one variable)

دالة متصلة

function, continuous

(انظر: continuous function) عنصر دالي لدالة تحليلية في متغير مركب

function element of an analytic function of a complex variable

(analytic continuation

(انظر: استمرار تحلیلی

دالة صحيحة

function, entire

(entire function : انظر)

دالة زوجية

function, even

لا تتغير قيمتها إذا (a>0) [-a,a] نطاق تعریفها فتره f(x) داله تغيرتُ إشْارْة المتغير المُسْتَقَل ، أي أنُ

f(-x) = f(x) f(-x) = f(x) f = x $e_{A} = x$ f(x) = x f(x

 $f(x) = x^2 , f(x) = \cos x$

دالة أسية

function, exponential

e^x الدالة – ۱

 $a\neq 1$ الدالة a خيث a ثابت موجب وإذا كان $a\neq 1$ فإن الدالة $f(x)=a^x$ الدالة f تكون هي معكوس الدالة اللوغاريتمية .

z دالة يظهر فيها المتغير (أو المتغيرات) كأساس أو كأس أو كليهما مثل e^z تعرف الدالة z=x+iy تعرف الدالة z=x+iy

إما بالصورة

 $e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$

وإما بالصورة

•
$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

!3 !2 وللدالة الآسية e^x خاصيتان هامتان هما

•
$$e^u e^v = e^{u+v}$$
, $\frac{de^z}{dz} = e^z$

وإذا اقتصر على الأعداد الحقيقية فإن الدوال الآسية هي الدوال المتصلة الوحيدة التي تحقق المعادلة الدالية لجميع الأعداد الحقيقية u, v.

دالة جاما

function, Gamma

(Gamma function : انظر)

دالة "هاملتون"

function, Hamilton

مجموع طاقتي الحركة والوضع.

دالة توافقية

function, harmonic

(harmonic function :انظر)

دالة تحليلية

function, holomorphic = function, analytic

(انظر: دالة تحليلية لمتغير مركب

(analytic function of a complex variable

دالة ضمنية

function, implicit

(implicit function : انظر)

دالة متزايدة

function, increasing

(increasing function :انظر)

دالة قابلة للتكامل

function, integrable

(integrable function : انظر)

دالة صحيحة = دالة كلية

function, integral = function, entire

(entire function : انظر)

معكوس دالة

function, inverse of a

(inverse function: انظر)

دالة لوغاريتمية

function, logarithmic

 $\log f(x)$ کل دالة يعبر عنها بالصورة

دالة قابلة للقياس

function, measurable

(measurable function

(انظر:

دالة كسرية

function, meromorphic

(meromorphic function

(انظر:

دالة اشتقاقبة

function, monogenic analytic

(انظر: دالة تحليلية وحيدة الأصل monogenic function)

دوال مطردة الزيادة

function, monotonic increasing

دوال تزداد قيمتها أو تظل ثابتة كلما زاد المتغير المستقل.

دالة متعددة القيمة

function, multiple-valued

علاقة بين متغيرين، يأخذ المتغير التابع فيها أكثر من قيمة و احدة لقيمة و احدة على الأقل من قيم المتغير المستقل في النطاق. فمثلا العلاقة المعرفة بالمعادلة $x^2 + y^2 = 1$ هي دالة مزدوجة القيمة إذا اعتبرنا y دالة في x لأن $y = \pm \sqrt{1-x^2}$ عندما يكون |x| = |x|. و العلاقة المعرفة بالمعادلة $y = \pm \sqrt{1-x^2}$ $y = \pm \sqrt{1-x^2}$ y = -1 القيمة لأن y = -1 y = -1 النظر: علاقة y = -1 النظر: علاقة y = -1 النظر: علاقة y = -1

دالة فردية

function, odd

دالة f(x) نطاق تعریفها فترة [-a,a] نتغیر إشارتها عندما تتغیر إشارة المتغیر المستقل، أي أن

f(-x) = -f(x) . ومن أمثلة الدوال الفردية $f(x) = x^3$

C'' فصل دالة من فصل

function of class C^*

n دالة منصلة ولها مشتقات متصلة حتى رتبة n (بما في ذلك الرتبة C نفسها). الدوال من الفصل C هي فئة كل الدوال المتصلة.

 L_{p} دالة من فصل

function of class L_p

تكون الدالة f من فصل L_p على فترة Ω أو فئة قابلة للقياس في Ω إذا كانت قابلة للقياس وكان تكامل $|f(x)|^p$ على Ω محدوداً.

دالة تناقصية في متغير واحد

function of one variable, decreasing

(decreasing function of one variable: انظر)

دالة صحيحة مُنطَقة في متغير واحد = كثيرة حدود في متغير واحد function of one variable, rational integral = polynomial in one variable

(polynomial فيرة حدود)

دالة في عدة متغيرات

function of several variables

دالة f تربط متغیرا z بمتغیرات x_1,x_2,\cdots,x_n عددها n حیث $n \ge 2$

 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

دالة في متغيرين

function of two variables

إذا كانت الدالة f تربط متغيرا z بكل زوج (x,y) من المتغيرات z=f(x,y) من المتغيرات z=f(x,y) فإنه يقال أن z دالة في المتغيرين z=2x+x اللذين يسميان المستقلين. مثال ذلك المعادلة في متغير واحد هو النقطة التي كدالة في المتغيرين x, y أو كدالة في متغير واحد هو النقطة التي إحداثياها (x,y).

دالة دورية

function, periodic

(periodic function : انظر)

```
دالة تحليلية
function, regular
                                    ( انظر :دالة تحليلية في متغير مركب
                 ( analytic function of a complex variable
                                                          دالة سلمية
function, step
                                            (idu: انظر: step function)
                                                        دالة الانسياب
function, stream
 في ميكانيكا الموائع: إذا كان الانسياب في بعدين وكانت معادلات خطُوطه هي
                    فإن f(x,y) تسمى دالة الانسياب. فإن f(x,y)
                                                     دالة تحت جمعية
function, sub-additive
                                    (additive function, sub- انظر)
                                                    دالة تحت توافقية
function, subharmonic
                                   (subharmonic function : انظر)
                                                        نظربة الدوال
function theory = functions, theory of
                                      ( theory of functions : انظر )
                                            دالة φ لـ "أويلر"
function, Euler \phi-
                                      (Euler φ -function :انظر)
function, transcendental
                                  (transcendental (انظر: مُتسامى)
```

دالة مثلثية

function, trigonometric

(trigonometric functions (انظر: دوال مثلثية

دالة غير محدودة

function, unbounded

(unbounded) غير محدود

دالة متجهة

function, vector

دالة تتضمن متجهات. فمثلا الدالة

 $F = f_1 \mathbf{i} + f_2 \mathbf{j} + f_3 \mathbf{k}$

حيث f_1, f_2, f_3 دوال قياسية و i, j, k وحدات المتجهات في النجاهات محاور الإحداثيات هي دالة متجهة.

دال

functional

راسم نطاق تعريفه فئة من الدوال ومداه متضمن في فئة الأعداد الحقيقية أو المركبة.

محدِّد دالي = جاكوبي عدد من الدوال في عدد متساو من المتغيرات functional determinant =Jacobian of a number of functions in as many variables

(نظر: Aacobian of a number of functions in as many variables)

تفاضلة دال

functional, differential of

إذا كان f دالاً من فئة الدوال C_1 إلى فئة الدوال f فإن تفاضلة f عند f ذات الزيادة f تكون دالاً متصلاً، قابلاً للجمع f عند f من f إلى f بحيث يكون $f(y_0, \delta y_0) - f(y_0, \delta y_0) + R$

 $f(y_0 + \delta y) - f(y_0) = \delta f(y_0, \delta y_0) + R$ حيث رتبة R أعلى من δy ، وذلك لكل δy في جوار ما للدالة الصفرية في C_1 .

دوال "بسل"

functions, Bessel

(Bessel functions : انظر)

دوال مرتبطة

functions, dependent

(dependent functions : انظر)

الدوال الزائدية

functions, hyperbolic

(hyperbolic functions : انظر)

دوال مطردة النقصان

functions, monotonic decreasing

دوال تنقص قيمتها أو تظل ثابتة كلما زاد المتغير المستقل.

دوال متعامدة

functions, orthogonal

(orthogonal functions :انظر)

مُقْرِن

functor

إذا كان L,K نسقين، وكانت O_K , M_K و O_L , M_L و التشاكلات للنسقين O_K على الترتيب فإن المقرن O_K هو دالة مجالها O_K . O_K , O_K , O_K

فرض أساسى

fundamental assumption

(assumption انظر: فرض

زمرة أساسية

fundamental group

إذا كانت S فئة يمكن وصل كل نقطتين من نقطها بمسار فأن الزمرة الأساسية للفئة S هي مقسوم الزمرة (quotient group) الناشئ عن قسمة

زمرة جميع المسارات التي نقطتا البداية والنهاية لكل منها هي نقطة محددة P على الزمرة الجزئية لجميع المسارات القابلة للتحول السي المسار الذي يتركب من النقطة P وحدها.

المتطابقات الأساسية في حساب المثلثات

fundamental identities of trigonometry

(trigonometric functions انظر: الدوال المثلثية

التمهيدية الأساسية في حساب التغيرات

fundamental lemma of the Calculus of Variations

تمهيدية تنص على أنه إذا كانت α متصلة في الفترة $a \le x \le b$ وكان التكامل $a \le x \le b$ التي لها مشتقات أولي التكامل $\phi(x)$ الجميع الدوال $\phi(x)$ الفترة $a \le x \le b$ فإن $\alpha(x) = 0$ وكانت $\alpha(x) = 0$ فإن $\alpha(x) = 0$ وكانت $\alpha(x) = 0$ فإن $\alpha(x) = 0$ متصلة في الفترة $\alpha(x) = 0$ وكانت $\alpha(x) = 0$ فإن $\alpha(x) = 0$ في الفترة $\alpha(x) = 0$ في الفترة وكانت $\alpha(x) = 0$ في الفترة وكانت $\alpha(x) = 0$ في الفترة وكانت $\alpha(x) = 0$ في الفترة وكانت الفترة وكانت المتحدد المتحد

الأعداد الأساسية والدوال الأساسية = القيم المميّزة والدوال المميّزة fundamental numbers and functions = eigenvalues and eigenfunctions

(eigenfunction ، دالة ذاتية eigenvalue) انظر: قيمة ذاتية

عمليات الحساب الأساسية

fundamental operations of arithmetic

عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة.

الدورة الأساسية لدالة دورية في متغير مركب

fundamental period of a periodic function of a complex variable = period of a periodic function of a complex variable

(انظر: دالة دورية في متغير مركبperiodic function of a complex) (variable

متتابعة أساسية = متتابعة " كوشى"

fundamental sequence = sequence, Cauchy's

(Cauchy's sequence : انظر)

النظرية الأساسية في الجبر

fundamental theorem of Algebra

 $n \ge 1$, n النظرية التي تنص على أن لكل معادلة كثيرة حدود من درجة $n \ge 1$, جذرا واحدا على الأقل.

النظرية الأساسية في الحساب

fundamental theorem of Arithmetic

النظرية الأساسية في حساب التفاضل والتكامل

fundamental theorem of Calculus

النظرية التي تحدد العلاقة بين التفاضل والتكامل ويمكن التعبير عنها بإحدى العبارتين

بحیث أن
$$F'(x) = f(x)$$
 و وجدت الدالة $F'(x) = f(x)$ بحیث أن $F'(x) = f(x)$ فإن $F'(x) = f(x)$ فإن $F'(x) = f(x)$ في الفترة المغلقة $F'(x) = f(x)$ فإن $F(x) = f(x)$

F كالآتي: f(x)dx كالآتي: F كالآتي:

$$F(x) = \int_{a}^{x} f(x) dx$$

لقيم x في الفترة المغلقة $[a\,,\,b]$ ، فإن الدالة F تكون قابلة للاشتقاق عند x ويكون x إذا وقعت في x وكانت x متصلة عند x x متصلة عند x

صدس لجمع اللغة العربية المطبوعات الآتي بيانها:

١- المعجمات:

- معجم ألفاظ القرآن الكريم (ستة أجزاء) .
- معجم ألفاظ القرآن الكريم (جزءان الطبعة الثالثة) .
 - معجم الوسيط (جزءان قطع صغير وكبير).
- المعجم الوجيز (قطع صغير وكبير تجليد عادى وفاخر).
 - المعجم الكبير (صدر منه أربعة أجزاء).
 - معجم ألفاظ الحضارة.
 - معجم الكيمياء والصيدلة .
 - معجم الفيزيقا النووية .
 - معجم الفيزيقا الحديثة (جزءان).
 - المعجم الفلسفي .
 - معجم الهيدرولوچيا .
 - معجم البيولوچيا (جزءان).
 - معجم الچيولوچيا .
 - معجم علم النفس والتربية .
 - المعجم الجغرافي .
 - معجم المصطلحات الطبية (مزءان) .
 - معجم النفط.
 - معجم الرياضيات .
 - معجم الهندسة .
 - معجم القانون .
 - معجم الموسيقا .

٢- كتب التراث العربي .

- كتاب الجيم (أربعة أجزاء).
- التنبيه والإيضاح (جزءان) .
 - الأفعال (أربعة أجزاء).
- ديوان الأدب (أربعة أجزاء)

- الإبدال .
- الشوارد.
- التكملة والذيل والصلة (سنة أجزاء).
 - عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى .
 - غريب الحديث (خمسة أجزاء).

٣- مجموعة المصطلحات الملمية والفنية (سبحة وثلثون مزءاً)

٤- مجلة مجمع اللغة العربية (ثمانون عددًا).

٥- كتب القرارات العلمية:

- القرارات العلمية في ثلاثين عاماً.
- القرارات العلمية في خمسين عاماً.
 - أصول اللغة (ثلاثة أجزاء).
- الألفاظ والأساليب (ثلاثة أجزاء) .

٢- محاضر جلسات مبلس ومؤتمر المجمع حتى السابعة والأربعون.

٧- كتب في شؤون هجمعية مختلفة .

- المجمعيون.
- مع الخالدين .
- مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً.
- مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً
 - كتاب لغة تميم .
- محاضرات مجمعية للأستاذ الدكتور شوقى ضيف .
 - كتاب طه حسين في المغرب.
 - شرح شواهد الإيضاح.

٨-إعادة طبع:

تم إعادة طبع الأعداد الخمسة الأولى من مجلة مجمع اللغة العربية .

الهيئة العامة لشئؤن المطابع الأميرية

رقه الإيداع ٧٣٤ / ٢٠٠٠

الترقيم الدولى 7 - 38 - 5037 - 977